



SANFERIN[®]

schützt natürlich!



INFORMATION
FÜR VERBRAUCHER

Es wurde Ihnen der Verzehr von SanFerIn®-Tabletten empfohlen, da Sie von den Inhaltsstoffen Lactoferrin, Lysozym, EGCG und Mannose profitieren können.



LACTOFERRIN ist ein Eiweiß, welches in hoher Konzentration in der Muttermilch vorkommt. Es ist im gesamten Organismus zu finden und somit ein wichtiger Bestandteil des angeborenen Immunsystems. Gewonnen wird das in SanFerIn® enthaltene Lactoferrin aus Kuhmilch.



LYSOZYM ist ein Enzym, welches ebenfalls im gesamten Organismus, z.B. in vielen Schleimhäuten vorhanden ist und auch zum angeborenen Immunsystem zählt. Da Lysozym im Hühnerei in höherer Konzentration vorkommt, wird das in SanFerIn® enthaltene Lysozym daraus gewonnen.



GRÜNTEE enthält **EGCG** (Epigallocatechingallat), eine besonders wertvolle Substanz, die zur Gruppe der Catechine gehört und die verschiedene Zellen des menschlichen Körpers positiv beeinflusst.



MANNOSE ist ein in der Natur weitverbreiteter Zucker, der entweder in gebundener Form als Mehrfachzucker oder in einfacher Form vorliegt. Nach Einnahme hilft er mit, die Harnwege beim Menschen gesund zu erhalten. Mannose kommt unter anderem in Äpfeln, Pfirsichen, Beeren wie Preiselbeeren und deren Kulturform, der Moosbeere (Cranberry), vor.

Sanferin® schützt
durch natürliche
Substanzen!

Aufgrund der Zusammensetzung können SanFerin® Tabletten eingesetzt werden bei:

- Personen, welche zu wiederholten Infektionen der oberen Atemwege oder der unteren Harnwege neigen,
- Personen, die wiederholt zu Hautunreinheiten unter Bildung von Pickeln und Eiterbläschen (Pusteln) neigen,
- Personen, bei denen das Immunsystem geschwächt ist,
- Personen, die Antibiotika einnehmen.

Wie sollen SanFerin® Tabletten eingenommen werden?

Erwachsene und Kinder ab dem 10. Lebensjahr:

Die ersten zwei Tage: 2 x 3 Tabletten (6 Tabletten) pro Tag,
in weiterer Folge: 2 x 2 Tabletten (4 Tabletten) pro Tag

Kinder zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr:

Die ersten zwei Tage: 2 x 2 Tabletten (4 Tabletten) pro Tag,
in weiterer Folge: 2 x 1 Tablette (2 Tabletten) pro Tag


Die Tabletten mit reichlich Flüssigkeit vor oder zu einer Mahlzeit einnehmen.

Wann sollen SanFerin® Tabletten nicht eingenommen werden?

SanFerin® Tabletten sind in der Regel gut verträglich, lediglich Personen mit Hühnereiallergie ist von der Einnahme abzuraten, da Lysozym von Hühnereiern gewonnen wird. Deshalb sollten auch Kinder zwischen dem 6. und dem 10. Lebensjahr Sanferin® Tabletten dann nicht einnehmen, wenn eine Hühnereiallergie nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

Bei einer zusätzlichen Einnahme von SanFerin® Tabletten mit Antibiotika sollte die Einnahme mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Lactosefrei, glutenfrei, zuckerfrei und farbstofffrei!



PRODUKTBESCHREIBUNG

1 Tablette SanFerIn® enthält:

Lactoferrin	50 mg
Lysozym	20 mg
Grüntee-Extrakt*)	100 mg
Mannose	150 mg
Zink	2 mg

*) enthält Epigallocatechingallat (EGCG)

Lactosefrei, glutenfrei, zuckerfrei und farbstofffrei!

Zutaten:

D-Mannose, Grüntee-Extrakt, Lactoferrin, Lysozym-HCl, Zinksulfat,
Füllstoffe: Cellulose, Hydroxypropylcellulose, vernetzte Carboxymethylcellulose,
Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren;
Überzug: Hydroxypropylmethylcellulose, Polysorbat 80, Polyvinylalkohol,
Polyethylenglycol, Talkum.



Packungsgrößen:

SanFerIn® Tabletten zu 20 Stk., 40 Stk. und 80 Stk.

Das Verfalldatum auf der Außenverpackung und am Tablettenblistert beachten.
Nach Ablauf nicht mehr anwenden. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern lagern.

Weitere Auskünfte zu SanFerIn® Tabletten können Sie anfordern: