

<b>PZN: 16149603</b>	<b>Datum: 17.07.20</b>
<b>Produktname: diarrhoesan® elektrolyt</b>	<b>Dr. Loges + Co. GmbH Schützenstraße 5 21423 Winsen (Luhe)</b>

Status:

- Nahrungsergänzungsmittel   
 Lebensmittel   
 diätetisches Lebensmittel  
 \_\_\_\_\_

Zutaten:

Dextrose-Monohydrat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Trikaliumcitrat-Monohydrat, Trinatriumcitrat-Dihydrat, Heidelbeer-Fruchtpulver, Heidelbeer-Extrakt, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma, Süßungsmittel: Sucralose

Zusammensetzung:

Nährwertdeklaration	Pro 100 g	Pro 100 ml	Pro Portion	
			1 Beutel	2 Beutel
Brennwert	1.351 kJ/317 kcal	43 kJ/10 kcal	85 kJ/20 kcal	170 kJ/40 kcal
Fett	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
davon gesättigte Fettsäuren	< 0,1 g	0 g	0 g	0 g
Kohlenhydrate	72 g	2,3 g	4,5 g	9,0 g
davon Zucker	59 g	1,9 g	3,7 g	7,4 g
Glukose	56 g	1,8 g	3,5 g	7,0 g
Eiweiß	< 0,5 g	0 g	0 g	0 g
Salz	10,9 g	0,35 g	0,69 g	1,38 g
Natrium	4.352 mg	137 mg	274 mg	548 mg
Kalium	2.443 mg	77 mg	154 mg	308 mg
Chlorid	4.508 mg	142 mg	284 mg	568 mg

Packung enthält 10 bzw. 5 Portionen.

Aufbewahrungsbedingung und ggf. Verwendungsbedingung nach dem Öffnen:

Bitte bewahren Sie diarrhoesan® elektrolyt an einem trockenen Ort, vor Licht geschützt und nicht über 25 °C auf.

Nettofüllmenge/Stückzahl/Abtropfgewicht:

10 Portionsbeutel = 63 g

Gebrauchsanleitung, Zubereitungshinweis, sonstige Hinweise:

**Anwendungshinweis:**

Der Inhalt eines Beutels wird - unmittelbar vor Verwendung - in 200 ml Trinkwasser gelöst

und direkt getrunken. Achten Sie bei der Zubereitung bitte genau auf das angegebene Mischungsverhältnis.

Die Häufigkeit der Anwendung richtet sich nach dem individuellen Bedarf, in der Regel mehrmals täglich bzw. nach jedem flüssigen Stuhlgang:

- Kleinkinder (1 bis 3 Jahre): 3 bis 5 Beutel in 24 Stunden
- Kinder ab 4 Jahre: 1 Beutel nach jedem Stuhlgang, maximal 8 Beutel in 24 Stunden
- Jugendliche und Erwachsene: 1 bis 2 Beutel nach jedem Stuhlgang

Die individuelle Dauer der Anwendung richtet sich nach der Anweisung des Arztes. Sie beträgt bei Kleinkindern in der Regel 6-12 Stunden und sollte 24 Stunden nicht überschreiten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene: Bis zum Abklingen des Durchfalls, höchstens 36 Stunden. Sollte der Durchfall länger andauern, ist nochmals der Arzt aufzusuchen.