



# Barijodeel®

## Tabletten

---

Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:** 1 Tablette enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Barium carbonicum Trit. D12 30 mg, Strychnos ignatii Trit. D6 30 mg, Datura stramonium Trit. D4 30 mg, Kalium phosphoricum Trit. D6 30 mg, Arnica montana Trit. D4 30 mg, Causticum Hahnemanni Trit. D6 45 mg, Semecarpus anacardium Trit. D6 45 mg, Aconitum napellus Trit. D12 45 mg, Calcium iodatum Trit. D4 15 mg.

Sonstiger Bestandteil: Magnesiumstearat (Ph. Eur.)

Gemeinsame Potenzierung über die letzten 2 Stufen als Verreibung.

50 und 250 Tabletten

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH


Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, D-76532 Baden-Baden

Telefon: 07221-50100, Telefax: 07221-501690

**Anwendungsgebiete:** Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen. Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei anhaltenden, unklaren oder neuen Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die eine ärztliche Abklärung und Behandlung erfordern.

**Gegenanzeigen:** Barijodeel ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen "Arnica montana" (Bergwohlverleih), oder anderen Korbblütlern nicht anzuwenden.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Siehe unter Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.



**-Heel**

---





### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:**

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Das Arzneimittel enthält Lactose.

### **Wechselwirkungen:**

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Soweit nicht anders verordnet: 1-3 mal täglich 1 Tablette einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Bei der Anwendung dieses Präparates sind keine Nebenwirkungen bekannt geworden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten teilen Sie diese Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Das Präparat ist an einem trockenen Ort bei normaler Zimmertemperatur aufzubewahren.

**Stand der Information:** 06/2004

