

Gebrauchsinformation

Sabalvit®

Lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

SABALVIT®

Wirkstoff: Sägepalmenfrüchte-Extrakt 160 mg.

ZUSAMMENSETZUNG

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 Weichkapsel enthält: 160 mg Extrakt aus Sägepalmenfrüchten (9-11:1), Auszugsmittel: Ethanol 96% (V/V).

Sonstige Bestandteile: Gelatinepolysuccinat, Glycerol 85%, gereinigtes Wasser, Titandioxid (E 171), Eisen(III)-hydroxid-oxid (E 172).

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Weichkapseln.

Originalpackung mit 40 Weichkapseln.

Originalpackung mit 200 Weichkapseln.

Unverkäufliches Muster mit 40 Weichkapseln.

PFLANZLICHES ARZNEIMITTEL BEI PROSTATA-ERKRANKUNGEN

PHARMAZEUT. UNTERNEHMER

Ruhrpharm AG
Heidsieker Heide 114
33739 Bielefeld

HERSTELLER:

CPM Contractpharma GmbH & Co KG
Frühlingstraße 7
83620 Feldkirchen-Westerham

ANWENDUNGSGEBIETE

Beschwerden beim Wasserlassen bei einer gutartigen Vergrößerung der Prostata (Miktionsbeschwerden bei benigner Prostatahyperplasie, Stadium I bis II nach Alken bzw. II bis III nach Vahlensieck).

Hinweis: Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf.

Insbesondere bei Blut im Urin oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE


GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie *Sabalvit*® nicht anwenden?

Keine bekannt.

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Dieses Medikament bessert nur die Beschwerden bei einer vergrößerten Prostata, ohne die Vergrößerung zu beheben. Bitte suchen Sie daher in regelmäßigen Abständen Ihren Arzt auf.



DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt *Sabalvit*[®] nicht anders verordnet hat.
Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da *Sabalvit*[®] sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und in welchen Mengen sollten Sie *Sabalvit*[®] anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, 2 x täglich eine Weichkapsel mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Wie und wann sollten Sie *Sabalvit*[®] anwenden?

Die Weichkapseln unzerkaut mit reichlich Flüssigkeit nach dem Essen einnehmen.

Wie lange sollen Sie *Sabalvit*[®] anwenden?

Befragen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.

ANWENDUNGSFEHLER UND ÜBERDOSIERUNG

Was ist zu tun, wenn *Sabalvit*[®] in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigt oder versehentlich)?
Sofortmaßnahmen sind in der Regel nicht erforderlich. Informieren Sie jedoch in jedem Fall Ihren Arzt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig *Sabalvit*[®] angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?
Die Anwendung sollte normal, d.h. ohne Dosierungsänderung, fortgeführt werden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?
Eine vorzeitige Unterbrechung oder Beendigung der Behandlung ist in der Regel unbedenklich.
Befragen Sie jedoch hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.

NEBENWIRKUNGEN

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von *Sabalvit*[®] auftreten?

Selten Magen-Darm-Beschwerden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Beim Auftreten von Magen-Darm-Beschwerden sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.
Normalerweise verschwinden aufgetretene Symptome nach dem Absetzen des Arzneimittels nach kurzer Zeit.
Befragen Sie hierzu Ihren Arzt oder Apotheker.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES ARZNEIMITTELS

Das Verfalldatum dieser Packung ist aufgedruckt.
Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

STAND DER INFORMATION

Juli 2004.