

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.



Calcivit D[®] Brausetabletten

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 Brausetablette enthält 1500 mg Calciumcarbonat, entsprechend 600 mg oder 15 mmol Calcium-Ionen und 10 µg Colecalciferol (Vitamin D₃), entsprechend 400 I.E. Vitamin D₃.

Sonstige Bestandteile: wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Gelatine, (RS)-Hydroxybernsteinsäure, Maisstärke, Maltodextrin, Natriumcarbonat, Natriumcycloamat, Natriumhydrogencarbonat, Saccharin-Natrium, Sojabohnenöl, Sucrose, α-Tocopherol (Ph.Eur.), Aromastoffe (Zitronengeschmack)

Hinweis für Diabetiker

1 Brausetablette enthält 0,003 BE.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 20 (N1), 40 (N2) und 100 (N3) Brausetabletten

Calcium-Vitamin-D₃-Präparat

HEXAL AG

Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen
Telefon: (08024) 908-0, Telefax: (08024) 908-1290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller

Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete

Bei nachgewiesenem Calcium- und Vitamin-D₃-Mangel sowie zur unterstützenden Behandlung von Osteoporose.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Calcivit D[®] Brausetabletten nicht einnehmen?

Sie dürfen Calcivit D[®] Brausetabletten nicht einnehmen bei

- bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile der Brausetablette
- erhöhtem Calciumgehalt des Blutes (Hypercalcämie)
- vermehrter Calciumausscheidung im Harn (Hypercalcurie)
- Nierenkalksteinen
- Gewebsverkalkungen der Niere (Nephrocalcinose)

- eingeschränkter Nierenfunktion (Niereninsuffizienz)
- Überfunktion der Nebenschilddrüse, der meist ein Nebenschilddrüsenadenom mit erhöhter Parathormonausschüttung zugrunde liegt (primärer Hyperparathyreoidismus)
- Vitamin-D-Überdosierung
- multiplem Knochenmarkstumor (Myelom)
- Tochtergeschwülsten im Knochen (Knochenmetastasen)
- Ruhigstellung von Gliedmaßen (Immobilisationsosteoporose)
- bestimmte Lungenerkrankungen (Sarkoidose, Morbus Boeck).

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Calcivit D[®] Brausetabletten sollten wegen der hohen Dosierung an Vitamin D₃ während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Während der Schwangerschaft müssen Überdosierungen von Vitamin D₃ vermieden werden, da ein langanhaltend erhöhter Calciumgehalt im Blut (Hypercalcämie) zu körperlicher Fehlbildung und geistiger Behinderung des Kindes führen kann.

Calcium geht in geringen Mengen in die Muttermilch über, ohne einen nachteiligen Effekt auf das Kind zu haben.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Während einer Langzeittherapie ist der Serum- und Urincalciumspiegel sowie die Nierenfunktion regelmäßig zu kontrollieren. Gegebenenfalls kann Ihr Arzt, abhängig von den gemessenen Werten, die Dosierung reduzieren oder die Behandlung unterbrechen.

Eine zusätzliche Einnahme von Calcium und Vitamin D darf nur unter ärztlicher Kontrolle, einschließlich wöchentlicher Überprüfung des Serum- und Urincalciumspiegels, erfolgen.

Besondere Vorsicht ist bei gleichzeitiger Einnahme von Digitalis, Thiazid-Diuretika, Tetracyclinen, Vitamin D, Natriumfluorid oder Bisphosphonaten geboten.

Bei Patienten, die unter einer gestörten Nierenfunktion leiden, ist Calcivit D[®] Brausetabletten mit Vorsicht anzuwenden. Bei diesen Patienten sollte der Serum- und Urincalciumspiegel kontrolliert werden.

Bitte beachten Sie den Gutschein auf der Rückseite

Sie haben Calcivit D[®] Brausetabletten verordnet bekommen. Möchten Sie noch mehr über das Arzneimittel oder über die Erkrankung "Osteoporose" erfahren? Fordern Sie bitte mit diesem Gutschein unsere kostenlose Informationsbroschüre an. Senden Sie den ausgefüllten Gutschein an:

HEXAL AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen

Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und unterliegen den Datenschutzbestimmungen.

Wechselwirkungen

Welche Wechselwirkungen zwischen Calcivit D® Brausetabletten und anderen Arzneimitteln sind zu beachten?

Beachten Sie bitte, dass die folgenden Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können. Bitte unterrichten Sie Ihren Arzt oder Apotheker über weitere Arzneimittel, die Sie einnehmen, da diese die Wirkung von Calcivit D® Brausetabletten beeinflussen können.

Bei gleichzeitiger Behandlung mit Digitalisglykosiden kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Eine strenge ärztliche Kontrolle, einschließlich EKG-Untersuchung und Kontrolle des Calcium-Blutspiegels, ist deshalb erforderlich.

Bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln der Stoffgruppe der Thiazide sollte der Serumcalciumspiegel regelmäßig kontrolliert werden, da Thiazide die Ausscheidung von Calcium mit dem Urin einschränken.

Calcium vermindert die Aufnahme (Resorption) von Natriumfluorid, Bisphosphonaten und Tetracyclinen. Deshalb sollte Calcivit D® Brausetabletten 2 Stunden nach einer Bisphosphonat- bzw. Natriumfluorid-Einnahme und mindestens 3 Stunden nach einer Tetracyclin-Einnahme angewendet werden.

Zwischen der Gabe von Colestyramin und Calcivit D® Brausetabletten sollten mindestens 2 Stunden Abstand eingehalten werden, da es sonst zu einer Resorptionsbeeinträchtigung des Vitamin D₃ kommt.

Gleichzeitige Gabe von Calcivit D® Brausetabletten und Rifampicin, Phenytoin, Barbituraten oder Glucocorticoiden kann zu einer Wirkungsverringerung von Vitamin D₃ führen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Calcivit D® Brausetabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Calcivit D® Brausetabletten sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von Calcivit D® Brausetabletten und wie oft sollten Sie Calcivit D® Brausetabletten einnehmen?
Erwachsene nehmen 2-mal täglich 1 Brausetablette (entsprechend 1200 mg Calcium und 800 I.E. Vitamin D₃) ein.

Wie und wann sollten Sie Calcivit D® Brausetabletten einnehmen?
Die Brausetablette wird in 1 Glas Wasser aufgelöst und sofort getrunken.

Sie sollten Calcivit D® Brausetabletten morgens und abends einnehmen.

Wie lange sollten Sie Calcivit D® Brausetabletten einnehmen?

Die Dauer der Anwendung wird vom Arzt bestimmt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Calcivit D® Brausetabletten in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Eine Überdosierung kann zu Übelkeit, Erbrechen krankhaftem Durstgefühl oder Verstopfung führen. Bei Verdacht auf Überdosierung verständigen Sie bitte sofort Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen einleiten.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Calcivit D® Brausetabletten eingenommen oder eine Anwendung vergessen haben?

Sollten Sie einmal vergessen haben, Calcivit D® Brausetabletten einzunehmen, nehmen Sie das Präparat beim nächsten Mal wie gewohnt - auf keinen Fall die doppelte Menge - ein.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Sollten Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen, z. B. wegen möglicherweise aufgetretenen Nebenwirkungen, so sprechen Sie bitte vorher mit Ihrem Arzt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Calcivit D® Brausetabletten auftreten?

Unter der Behandlung mit Calcivit D® Brausetabletten kann es zu Verstopfung, Blähungen, Übelkeit, Magenschmerzen, Durchfall, erhöhter Calcium-Ausscheidung im Urin (Hypercalcurie) sowie zu erhöhtem Calcium-Blutspiegel (Hypercalcämie) kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Röhrchenboden aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Calcivit D® Brausetabletten aufzubewahren?

Bitte das Röhrchen fest verschlossen halten!
Trocken und nicht über 25 °C lagern.

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

560266

78308-082

Gutschein

Senden Sie mir bitte die kostenlose Informationsbroschüre zu Calcivit D® Brausetabletten.

Name: _____ Vorname: _____

Straße: _____ Wohnort: _____

Alter: _____ weiblich männlich