



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Einnahme dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Therapeuten oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Uroselect



### Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksame Bestandteile: Cantharis D4 trit. 83,3 mg, Sarsaparilla D3 trit. 83,3 mg, Scilla D4 trit. 83,3 mg.

Sonstige Bestandteile: Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

### Darreichungsform und Inhalt

Tabletten

Originalpackung mit 100 Tabletten.

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Harnwege.

Dreluso Pharmazeutika - Dr. Elten und Sohn GmbH

Marktplatz 5 - 31840 Hessisch Oldendorf

Telefon 05152 / 94240 - Telefax 05152 / 3408

### Anwendungsgebiete

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Reizungen der Harnwege mit Harnblasenentleerungsstörungen.

Hinweis: Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei akuter Harnverhaltung sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen

Es sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Uroselect in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### Vorsichtsmaßnahmen für Anwendung und Warnhinweise

Keine bekannt.





### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Allgemeiner Hinweis: In der Homöopathie ist bekannt, daß die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden kann. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, holen Sie medizinischen Rat ein.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Einnahme**

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3mal täglich 1 Tablette einnehmen.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne medizinischen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

Bei einer erheblichen Überdosierung (z.B. gesamter Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Falls Sie eine oder mehrere Einnahmen vergessen haben, setzen Sie die Einnahme bitte gemäß der Dosierungsanleitung fort, ohne die vergessenen Tabletten zusätzlich einzunehmen.

### **Nebenwirkungen**

Bei der Einnahme des Arzneimittels können Hautreaktionen auftreten; das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Umkarton und auf dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Öffnen des Behältnisses soll der Inhalt kontinuierlich verbraucht werden.

### **Stand der Information**

November 2000

Bewahren Sie Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

511500B

