

## Gebrauchsinformation

# Albothyl® Konzentrat

Wirkstoff: Policresulen

**Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Albothyl Konzentrat jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist Albothyl Konzentrat und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Albothyl Konzentrat beachten?
3. Wie ist Albothyl Konzentrat anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Albothyl Konzentrat aufzubewahren?

### Albothyl® Konzentrat

Wirkstoff: Policresulen

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Policresulen

1 g Vaginallösung enthält 360 mg Policresulen

Die sonstigen Bestandteile sind: Wasser; Edetinsäure

Albothyl Konzentrat ist in Packungen mit 100 ml (N3) Lösung erhältlich.

### 1. Was ist Albothyl Konzentrat und wofür wird es angewendet?

Albothyl Konzentrat ist ein keimtötendes Arzneimittel zur Anwendung in der Scheide (gynäkologisches Antiseptikum)

Albothyl Konzentrat ist ein Produkt von

#### Nycomed Deutschland GmbH

Moltkestraße 4

78467 Konstanz

Telefon: 0800/2 95-66 66

Telefax: 0800/2 95-55 55

E-Mail: servicecenter@nycomed.de

hergestellt von:

#### Nycomed GmbH

Byk Gulden Straße 2

78467 Konstanz

Albothyl Konzentrat wird angewendet zur Behandlung bakterieller Entzündungen der Scheide.

### 2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Albothyl Konzentrat beachten?

Albothyl Konzentrat darf nicht angewendet werden,

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Policresulen oder einem der sonstigen Bestandteile sind.

Albothyl Konzentrat ist nicht für die Anwendung bei

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren und bei Frauen nach den Wechseljahren bestimmt, da bisher keine Erfahrungen für diese Altersgruppen vorliegen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Albothyl Konzentrat ist erforderlich

Während der Behandlung mit Albothyl Konzentrat und an den 7 Tagen nach Beendigung der Behandlung muss der Geschlechtsverkehr unterlassen werden.

Waschungen mit Reizungen auslösenden Seifen müssen während der Behandlungszeit vermieden werden.

Albothyl Konzentrat wirkt weder gegen HIV-Infektionen noch gegen Geschlechtskrankheiten, wie z.B. Tripper oder Syphilis.

Albothyl Konzentrat sollte nicht während der Regelblutung angewendet werden.

Als ein Zeichen des therapeutischen Effektes kann es zur Abstoßung von abgestorbenem Gewebe – auch in größerem Umfang – aus der Scheide kommen. Daher sollten Vorlagen (Binden) getragen und regelmäßig bei Verschmutzung gewechselt werden, damit es durch die Gewebsreste nicht zu Reizungen der äußeren Geschlechtsteile kommt.

Sollte Albothyl Konzentrat versehentlich geschluckt worden sein, muss der Betroffene unverzüglich reichlich Wasser nachtrinken und so schnell wie möglich hinsichtlich einer möglichen Verätzung von Mund, Rachen und Speiseröhre ärztlich untersucht und behandelt werden.

Bei Kontakt von Albothyl Konzentrat mit den Augen ist eine sofortige Spülung mit Wasser vorzunehmen. Gegebenenfalls sollte ein Augenarzt zu Rate gezogen werden.

### Schwangerschaft und Stillzeit

Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf Albothyl Konzentrat nur bei strenger Indikationsstellung unter Berücksichtigung des Risikos für Mutter und Kind angewendet werden

Es liegen keine Untersuchungen zum Risiko bei einer Anwendung in der Schwangerschaft beim Menschen vor. Tierversuche haben aber keine Hinweise auf Fehlbildungen ergeben.

Es ist nicht bekannt, ob der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht.

### Verkehrstüchtigkeit, Bedienen von Maschinen und Arbeiten ohne sicheren Halt:

Auswirkungen auf die Verkehrstüchtigkeit, das Bedienen von Maschinen und das Arbeiten ohne sicheren Halt sind nicht bekannt.

### Wechselwirkungen

### Bei Anwendung von Albothyl Konzentrat zusammen mit anderen Arzneimitteln

Während der Behandlung mit Albothyl Konzentrat sollte



auf die Anwendung anderer vaginal anzuwendender Arzneimittel verzichtet werden, da Wechselwirkungen nicht ausgeschlossen werden können.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

### 3. Wie ist Albothyl Konzentrat anzuwenden?

#### Art der Anwendung

Anwendung in der Scheide

#### Wieviel von Albothyl Konzentrat und wie oft sollten Sie Albothyl Konzentrat anwenden?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, beträgt die übliche Dosis bis zu 50 ml Lösung.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Albothyl Konzentrat zu stark oder zu schwach ist.

Albothyl Konzentrat wird zur Touchierung in der Scheide unverdünnt angewendet. Die Touchierung wird 1-2mal wöchentlich durchgeführt.

#### Wie und wann sollten Sie Albothyl Konzentrat anwenden?

Die Anwendung erfolgt durch Ihren Arzt. Ein mit Albothyl Konzentrat getränkter Mulltupfer wird in die Scheide eingeführt und unter leichtem Druck 1-3 Minuten dort belassen.

Die anschließende Verwendung einer Vorlage (Binde) vermeidet die Verschmutzung der Wäsche (siehe auch „Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Albothyl Konzentrat ist erforderlich“)

#### Wie lange sollten Sie Albothyl Konzentrat anwenden?

Die Anwendung erfolgt insgesamt zweimal im Abstand von 3-4 Tagen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn die Krankheitszeichen danach nicht abgeklungen sind.

Es ist nicht bekannt, bei wie vielen Frauen es nach Beendigung der Behandlung mit Albothyl Konzentrat zu einem erneuten Auftreten einer bakteriellen Scheidenentzündung (Rezidiv) kommt.

#### Wenn Sie eine größere Menge Albothyl Konzentrat angewendet haben, als Sie sollten (Überdosierung)

Anzeichen (Symptome) einer Überdosierung sind nicht bekannt.

#### Wenn die Anwendung von Albothyl Konzentrat vergessen wurde

Wenn die erste Anwendung erfolgt ist, aber die zweite Anwendung von Albothyl Konzentrat nach 3-4 Tagen vergessen wurde, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, ob die Anwendung nachgeholt werden soll.

#### Wenn Sie die Behandlung mit Albothyl Konzentrat unterbrechen oder vorzeitig beenden

Wenn Sie die Behandlung unterbrechen wollen, so sprechen Sie bitte vorher mit ihrem Arzt.

Wenn die Behandlung mit Albothyl Konzentrat abgebrochen wird, kann es zum Wiederauftreten der Entzündung kommen, ggf. ist eine weitere oder eine andere Behandlung notwendig.

### 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Albothyl Konzentrat Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrundegelegt:

<b>Sehr häufig:</b> mehr als 1 von 10 Behandelten	<b>häufig:</b> weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>gelegentlich:</b> weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten	<b>selten:</b> weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
<b>sehr selten:</b> weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle	

Häufig: Brennen in der Scheide.

Weiterhin wurden die folgenden Nebenwirkungen berichtet: Hautausschlag mit juckenden Quaddeln (Nesselsucht), allergische, den ganzen Körper betreffende Reaktionen (z. B. schmerzhafte Schwellungen der Haut und des Unterhautgewebes, Juckreiz) bis hin zur Anaphylaxie, Hefepilz-Infektion der Scheide, Juckreiz am äußeren Genitale, Abgang von Schleimhautfetzen sowie Unbehagen, Trockenheit und Fremdkörpergefühl in der Scheide. Bei starken Reizungen der Scheide ist Albothyl Konzentrat abzusetzen. Eine andere antibakterielle Behandlung ist zu erwägen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

#### *Gegenmaßnahmen*

Bei starken lokalen Reizungen ist Albothyl Konzentrat abzusetzen. Bitte informieren Sie in einem solchen Fall ihren Arzt.

### 5. Wie ist Albothyl Konzentrat aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Albothyl Konzentrat sollte in der Faltschachtel aufbewahrt werden.

Nicht über 30° C aufbewahren!

Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses: 3 Monate

Das Arzneimittel darf nach dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwendet werden.

### 6. Weitere Angaben

Textilien und Leder sollten sofort nach Berührung mit Albothyl Konzentrat vor dem Antrocknen mit Wasser gereinigt werden. Das Instrumentarium u.ä. ist unmittelbar nach Gebrauch bis zur Sterilisation in einer Schale mit Wasser (eventuell unter Zusatz von 1-2% Natriumhydrogencarbonat) aufzubewahren.

#### **Stand der Information:**

Juli 2007