

GEBRAUCHSINFORMATION, aufmerksam lesen!

ENTERO- TEKNOSAL[®] PULVER

Wirkstoff : Siliciumdioxid

ZUSAMMENSETZUNG

10 g Pulver enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Hochdisperses Siliciumdioxid (90%SiO₂) 7.330 mg

Sonstige Bestandteile: Glucose, Pfefferminzöl, Apfelsinenschalenöl, Wacholderbeeröl

DARREICHUNGSFORM UND INHALT:

Pulver, Packungen mit 150, 500, 1000 ml.

STOFF- ODER INDIKATIONSGRUPPE:

Traditionelles Arzneimittel

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER UND HERSTELLER:

TACO GmbH, Alte Heerstr.76, 53757 St.Augustin

ANWENDUNGSGEBIETE:

Traditionell angewendet zur Unterstützung der Darmfunktion bei Durchfall. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. Bei Durchfallerkrankungen muss, besonders bei Kindern, auf Ersatz von Flüssigkeit und Elektrolyten als wichtigste therapeutische Maßnahme geachtet werden. Durchfälle bei Säuglingen und Kleinkindern erfordern die Rücksprache mit dem Arzt. Auch Erwachsene sollten bei Durchfällen, die länger als 3 Tage anhalten oder Blutbeimengungen aufweisen oder mit Fieber einhergehen, einen Arzt aufsuchen.

GEGENANZEIGEN:

Entero-Teknosal[®] Pulver darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile. Bei akutem Durchfall mit hohem Fieber oder Blutbeimengung sowie bei Kleinkindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr darf Entero-Teknosal[®] Pulver nur unter ärztlicher Überwachung verwendet werden.

WECHSELWIRKUNGEN:

Wegen einer möglichen Einschränkung der Aufnahme anderer Medikamente sollten diese zeitlich getrennt eingenommen werden.

DOSIERUNGSANLEITUNG:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 2-5 mal täglich 1-2 Messlöffel (Teelöffel) (1,7g - 3,4g) Pulver in Wasser ein. Kinder ab 6 Jahren die Hälfte. Kleinkinder siehe Gegenanzeigen. Entero-Teknosal® Pulver sollte möglichst 20 Minuten vor den Mahlzeiten, d.h. auf leeren Magen genommen werden! Die Anwendungsdauer ist prinzipiell nicht begrenzt, beachten Sie jedoch die Angaben unter Anwendungsgebiete. Sollte die Anwendung nach 3 Tagen erfolglos geblieben sein, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

NEBENWIRKUNGEN:

Bei langfristiger und hochdosierter Einnahme siliciumdioxidhaltiger Präparate ist sehr selten die Bildung von siliciumhaltigen Nierensteinen möglich. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte einem Arzt oder Apotheker mit. Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Präparat abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

HINWEISE ZUR HALTBARKEIT: Das Arzneimittel soll nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendet werden.

Stand der Information: Dezember 2004

Wir wünschen Ihnen eine schnelle Genesung.

Sehr wichtig ist es, bei allen Durchfallerkrankungen den erhöhten Wasser- und Salzverlust zu ersetzen. Trinken Sie deshalb ausreichend (z.B. süßen Tee mit etwas Salz). Es handelt sich bei dem in ENTERO-TEKNOSAL® enthaltenen Wirkstoff um ein rein physikalisch wirkendes Adsorbens mit einer auf den Magen-Darmkanal beschränkten Wirkung. Dieser Wirkstoff entfaltet seinen Effekt durch Oberflächenkräfte, die in der Lage sind, Bakterien, Viren, Toxine und andere Gifte zu binden. Eine frühzeitige Behandlung sowie eine reichliche Anfangsdosis sind unbedenklich und zu empfehlen!

ENTERO-TEKNOSAL®

SIRUP	Flaschen mit 200 g
PULVER	Packungen mit 150, 500 und 1000 ml
KAUTABLETTEN	Packungen mit 20, 50, 100 und 300 Stück