

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

Gebrauchsinformation

DEACURA® 5 mg

Tabletten

Wirkstoff: Biotin

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 Tablette enthält 5 mg Biotin

Sonstige Bestandteile:

Mikrokristalline Cellulose, Lactose-Monohydrat, Povidon (K = 30), Crospovidon, Magnesiumstearat

Darreichungsform und Inhalt:

OP mit 50, 100 und 200 Tabletten

Vitaminpräparat

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Str. 6; 82031 Grünwald
Tel.: 089/6 41 86-0; Fax: 089/6 41 86-130

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15; 06796 Brehna
(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Anwendungsgebiete:

Vorbeugung und Behandlung eines Biotin-Mangels (zur Vorbeugung sind weniger als 0,2 mg Biotin am Tag ausreichend). Behandlung eines Biotin-Mangels beim sehr seltenen Biotin-abhängigen, multiplen Carboxylasemangel.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie DEACURA® 5 mg nicht einnehmen?

DEACURA® 5 mg darf nicht eingenommen werden bei Unverträglichkeit gegen einen der Bestandteile. Wenn Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, dass Sie eine Unverträglichkeit gegenüber einigen Zuckern haben, halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Keine.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Es sind keine Beeinträchtigungen bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von DEACURA® 5 mg?

Es bestehen Hinweise, dass Arzneimittel gegen Krampfanfälle (Antikonvulsiva) den Spiegel von Biotin im Blutplasma senken.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt DEACURA® 5 mg nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da DEACURA® 5 mg sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von DEACURA® 5 mg und wie oft sollten Sie DEACURA® 5 mg einnehmen?

Es werden täglich 1-2 Tabletten DEACURA® 5 mg (entsprechend 5-10 mg Biotin) eingenommen. Zur Vorbeugung sind weniger als 0,2 mg Biotin am Tag ausreichend. Zur Therapie des multiplen Carboxylasemangels werden täglich 1-2 Tabletten DEACURA® 5 mg (entsprechend 5-10 mg Biotin) eingenommen. Für niedrigere Dosierungen stehen Präparate mit geringerem Gehalt an Biotin zur Verfügung.

Wie und wann sollten Sie DEACURA® 5 mg einnehmen?

DEACURA® 5 mg Tabletten werden unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit eingenommen.

Wie lange sollten Sie DEACURA® 5 mg einnehmen?

DEACURA® 5 mg Tabletten werden bis zur Normalisierung der Biotin-Werte im Blut eingenommen. Die Dauer ist abhängig vom Verlauf der Grunderkrankung. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Beim sehr seltenen Biotin-abhängigen, multiplen Carboxylasemangel, erfolgt die Einnahme lebenslang.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler:

Vergiftungen und Überdosierungserscheinungen sind nicht bekannt.

Nebenwirkungen:

Sehr häufig	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig	mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich	mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten	mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten	1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle