

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient, bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Nausyn® Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

Die Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Nausyn® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Nausyn® beachten?
3. Wie ist Nausyn® einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Nausyn® aufzubewahren?



Nausyn® Tabletten

Zusammensetzung:

In 1 Tablette sind verarbeitet: Arzneilich wirksame Bestandteile: Absinthium, ethanol. Infusum Ø (= D1) 3,5 mg / Cocculus Dil. D3 3,5 mg / Ipecacuanha, ethanol. Decoctum Dil. D3 3,5 mg / Nux vomica Dil. D9 (D3 mit Ethanol 43 Gew.-%, D4 mit Ethanol 30 Gew.-%, ab D5 mit Ethanol 15 Gew.-%) 3,5 mg / Petroleum rectificatum Dil. D7 (D3 mit Ethanol 62 Gew.-%, ab D4 mit Ethanol 43 Gew.-%) 3,5 mg.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Weizenstärke, Calciumbehenat.

Nausyn® ist in Packungen zu 100 Tabletten erhältlich.



1. Was ist Nausyn® und wofür wird es angewendet?

Nausyn® ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Reise- und Seekrankheit

von:

Weleda AG
Postfach 1309 / 1320
D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414
Fax: 07171 / 919-424
E-Mail: dialog@weleda.de

Anwendungsgebiete

Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten Reisekrankheit und Seekrankheit.

Bei länger anhaltenden oder unklaren Beschwerden suchen Sie bitte einen Arzt auf.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Nausyn® beachten?

Nausyn® darf nicht eingenommen werden, wenn Sie überempfindlich gegen Weizenstärke sind.

Kinder

Nausyn® Tabletten sollen bei Kindern unter 1 Jahr nicht angewendet werden, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.



Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln während der Schwangerschaft und in der Stillzeit Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von Nausyn®

Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen. Weizenstärke kann geringe Mengen an Gluten enthalten, die aber auch für Patienten, die an Zöliakie leiden, als verträglich gelten.

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels (z.B. gesamter Packungsinhalt) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Keine bekannt

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.



3. Wie ist Nausyn® einzunehmen?

Nehmen Sie Nausyn® immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nausyn® Tabletten werden mit etwas Wasser eingenommen. Kleinkinder sollten zur leichteren Einnahme die Tabletten zerdrückt oder in Wasser aufgelöst erhalten.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:
2 - 3 Tage vor der Reise beginnend
3 mal täglich 1 Tablette; während der
Reise alle 2 - 3 Stunden 1 Tablette.

Kleinkinder von 1 bis 5 Jahren:
2 - 3 Tage vor der Reise beginnend
2 mal täglich 1 Tablette; während der
Reise alle 4 Stunden 1 Tablette.

Wenn Sie die Einnahme von Nausyn® vergessen haben:

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Nausyn® Nebenwirkungen haben.



Weizenstärke kann Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Nausyn® aufzubewahren?

Bewahren Sie das Arzneimittel so auf, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Es gibt keine besonderen Anforderungen an die Aufbewahrung.

Stand der Information: Dezember 2004