

# Magnesium phosphoricum- Injeel<sup>®</sup> forte

Homöopathisches Arzneimittel

**Zusammensetzung:** 1 Ampulle zu 1,1 ml enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Magnesium phosphoricum Dil. D6 aquos. 0,275 ml; Magnesium phosphoricum Dil. D12 0,275 ml; Magnesium phosphoricum Dil. D30 0,275 ml; Magnesium phosphoricum Dil. D200 0,275 ml. Die Bestandteile 2 bis 4 werden über die letzten 3 Stufen gemäß HAB, Vorschriften 40a und 11 gemeinsam potenziert. Sonstiger Bestandteil: Natriumchlorid.

Flüssige Verdünnung zur Injektion  
10,100 Ampullen zu 1,1 ml

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4  
DE-76532 Baden-Baden  
Telefon: 07221-50100  
Telefax: 07221-501690

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.


Bei Fortdauer der Krankheitssymptome ist medizinischer Rat einzuholen. Hinweis: Bei einer Verschlimmerung der Beschwerden sowie bei neu auftretenden oder lang anhaltenden Beschwerden ist die Rücksprache mit Ihrem Therapeuten erforderlich.

**Gegenanzeigen:** Keine bekannt.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Magnesium phosphoricum-Injeel forte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:** Keine.

**-Heel**





9320/0000002679B/5001

DE

**Wechselwirkungen:** Keine bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.


**Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:** Bei akuten Zuständen bis zu 3mal täglich eine Ampulle. Bei chronischen Verlaufsformen eine Ampulle pro Tag i.m., s.c., i.c. oder i.v. injizieren. Zur Dosierung bei Kindern liegen keine dokumentierten Erfahrungen vor. Soll das Arzneimittel bei Kindern angewendet werden, ist die Dosierung vom Arzt festzulegen. Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Nebenwirkungen:** Keine bekannt.


**Hinweis:** Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:** Das Verfalldatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

**Stand der Information:** 07/2006



**Farbiger Punkt nach oben!**  
Im Ampullenspieß befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach



**Farbiger Punkt nach oben!**  
Ampullenspieß nach hinten ziehend abbrechen.

**-Heel**

