

Liebe Patientin, lieber Patient!

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss neo-angin® Halstabletten zuckerfrei jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3-4 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei beachten?
3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Gebrauchsinformation

neo-angin®

HALSTABLETTEN

ZUCKERFREI

Zur Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren und bei Erwachsenen

Wirkstoffe in einer Lutschtablette: 2,4-Dichlorbenzylalkohol 1,20 mg, Amylmetacresol 0,60 mg, Levomenthol 5,72 mg

1. Was sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei und wofür werden sie angewendet?

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sind ein Hals- und Rachen therapeutikum. Anwendungsgebiet: Zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei beachten?

neo-angin® Halstabletten zuckerfrei dürfen nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol, Levomenthol, Ponceau 4R oder einem der sonstigen Bestandteile von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sind,
- von Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren,
- bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen.

Bei Anwendung von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt. Wechselwirkungen sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Es liegen keine Daten über die Verträglichkeit von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. neo-angin® Halstabletten zuckerfrei dürfen in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.


Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol. Bitte nehmen Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

3. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei anzuwenden?

Wenden Sie neo-angin® Halstabletten zuckerfrei immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren lassen alle 2-3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen (maximal 6 Tabletten pro 24 Stunden). Die neo-angin® Halstabletten zuckerfrei sollten ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3-4 Tage angewendet werden.





Hinweis für Diabetiker: Eine neo-angin® Halstablette zuckerfrei – mit dem Zuckeraustauschstoff Maltitol – entspricht 0,22 BE. Maltitol wird unter Insulinbeteiligung abgebaut.

Wenn Sie die Einnahme von neo-angin® Halstabletten zuckerfrei vergessen haben

Sollten Sie eine Anwendung vergessen haben, bitte nehmen Sie dann nicht die doppelte Menge ein, sondern setzen Sie die Anwendung in der angegebenen Weise fort.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann neo-angin® Halstabletten zuckerfrei Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10
Häufig: 1 bis 10 Behandler von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandler von 1.000
Selten: 1 bis 10 Behandler von 10.000
Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen:

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, Schleimhautreizungen und Magenbeschwerden auftreten.

Ponceau 4R kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie sind neo-angin® Halstabletten zuckerfrei aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der äußeren Umhüllung und der Durchdrückpackung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:

Tabletten mit Maltitol-Lösung (Trockensubstanz) sind hygroskopisch, d. h. sie ziehen Feuchtigkeit aus der Umgebung an. Zur Aufbewahrung sollten neo-angin® Halstabletten zuckerfrei vor Feuchtigkeit geschützt und nicht über 25 °C gelagert werden.

6. Weitere Informationen

Was neo-angin® Halstabletten zuckerfrei enthält:

Die Wirkstoffe sind:

1 Lutschtablette enthält:	2,4-Dichlorbenzylalkohol	1,20 mg
	Amylmetacresol	0,60 mg
	Levomenthol	5,72 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Sternanisöl, Pfefferminzöl, Maltitol-Lösung (Trockensubstanz), Weinsäure (Ph.Eur.), Ponceau 4R (Zubereitung 80%).

Inhalt der Packung:

Originalpackung mit 24 (bzw. 48) Lutschtabletten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Straße 41

12277 Berlin

Tel.: 030/72007-266

Fax: 030/72007-326

Klosterfrau Kundenberatung:

Tel.: 0800/1652-100

Fax: 0800/1652-700

e-mail: dialog@klosterfrau-service.de

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen

Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Bulgarien	neo-angin bes sachar	Rumänien	neo-angin fără zahăr
Estland	neo-angin suhkruvabad	Slowakei	neo-angin bez cukru
Lettland	neo-angin bez cukura	Slowenien	neo-angin brez sladkorja
Litauen	neo-angin be cukraus	Tschechien	neo-angin bez cukru
Österreich	neo-angin zuckerfrei	Ungarn	neo-angin cukormentes
Polen	neo-angin		

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2007.

neo-angin®

HALSTABLETTE

ZUCKERFREI