



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre(n) Arzt/Ärztin oder Ihre(n) Apotheker/Apothekerin.

Gebrauchsinformation bitte sorgfältig lesen!

Cloderm Puder

Wirkstoff: Clotrimazol

Zusammensetzung:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

1 g Puder enthält 0,01 g Clotrimazol

Sonstige Bestandteile:

Zinkoxid, hochdisperses Siliciumdioxid, Talkum

Darreichungsform und Inhalt:

OP mit 30 g Puder

Breitspektrum-Antimykotikum

Pharmazeutischer Unternehmer:

Dermapharm AG

Luise-Ullrich-Straße 6

82031 Grünwald

Tel.: 0 89/6 41 86-0

Fax: 0 89/6 41 86-1 30

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel

Münchener Straße 15

06796 Brehna

(ein Tochterunternehmen der Dermapharm AG)

Anwendungsgebiete:

Der Puder dient zur Unterstützung der Lokalbehandlung von Creme oder Lösung, die gegen Pilze wirksam sind bzw. zur Nachbehandlung bei Pilzkrankungen der Haut und der Hautfalten.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Cloderm Puder nicht anwenden?

Cloderm Puder darf nicht angewendet werden bei einer Überempfindlichkeit gegen Clotrimazol oder einen der anderen Bestandteile.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Clotrimazol sollte aus Vorsicht nicht in der Frühschwangerschaft angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Keine.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Welche anderen Arzneimittel beeinflusst Cloderm Puder?

Clotrimazol vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Cloderm Puder** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Cloderm Puder** sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Cloderm Puder und wie oft sollten Sie Cloderm Puder anwenden?

Soweit nicht anders verordnet, werden die betroffenen Hautpartien 1- bis 2mal täglich eingepudert. Das Puder ist im Wechsel mit anderen Darreichungsformen, wie Creme oder Lösung, anzuwenden.

Wie lange sollten Sie Cloderm Puder anwenden?

Die Behandlungsdauer ist unterschiedlich. Sie hängt u.a. ab vom Ausmaß und der Lokalisierung der Erkrankung. Um eine komplette Ausheilung zu erreichen, sollte die Behandlung mit dem Puder nicht nach dem Abklingen der akuten entzündlichen Symptome oder subjektiver Beschwerden abgebrochen werden, sondern bis zu einer Behandlungsdauer von mindestens 4 Wochen fortgeführt werden.

Bei Fußpilz sollte zur Vermeidung von Rückfällen trotz rascher subjektiver Besserung ca. 2 Wochen über das Verschwinden der Krankheitszeichen hinaus behandelt werden.

Eine Nachbehandlung sollte eine Behandlungsdauer von 4 bis 5 Wochen nicht überschreiten.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Cloderm Puder auftreten?

In seltenen Fällen kann es zu Hautreaktionen (z.B. vorübergehende Rötung, Brennen, Stechen) kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin oder Ihrem Apotheker/Ihrer Apothekerin mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfallsdatum des Arzneimittels ist auf der Dose und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stand der Information:

Februar 2004

