

Biochemie nach
Dr. Schüßler



Nr. 7

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch, da sie
wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses
Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren
Arzt oder Apotheker.



Gebrauchsinformation

MAGNESIUM PHOSPHORICUM

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung

1 Tablette (265 mg) enthält je nach der auf Etikett und
Faltschachtel angegebenen Potenz (Verdünnung)

arzneilich wirksame/n Bestandteil/e:

Magnesium phosphoricum Trit. D 3 250 mg;
Magnesium phosphoricum Trit. D 6 250 mg;
Magnesium phosphoricum Trit. D 12 250 mg;

sonstige Bestandteile: (Arzneiträger Lactosemonohydrat),
Kartoffelstärke, Magnesiumstearat.

Enthält Lactose. Vorsichtsmaßnahmen beachten.

10 g Salbe (= 11,5 ml) enthalten

arzneilich wirksame/n Bestandteil/e:

Magnesium phosphoricum Trit. D 6 100 mg;

sonstige Bestandteile: (Arzneiträger Lactosemonohydrat),
Glycerolmonostearat 60, Cetylalkohol, Macrogol-20-glycerol-
monostearat, Mittelkettige Triglyceride, Propylenglykol, weißes
Vaseline, Wasser, gereinigt.

Enthält Lactose. Vorsichtsmaßnahmen beachten.



1105 / 14 148 002

Biochemie nach Dr. Schüßler

Homöopathisches Arzneimittel

Bombastus-Werke AG, Wilschauer Straße 170, D - 01705 Fretz

Bombastus

Darreichungsform und Inhalt

Tabletten zum Einnehmen (Lutschen)
Magnesium phosphoricum D 3
Magnesium phosphoricum D 6
Magnesium phosphoricum D 12
Jeweils in Gläsern mit 80, 200 und 500 Tabletten.

Creme zur Anwendung auf der Haut
Magnesium phosphoricum D 6
Tube mit 100 ml Creme (ab Frühjahr 2006)

Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller

Bombastus-Werke AG
Wilsdruffer Straße 170, D-01705 Freital
Tel. 0351/65803-0, Fax: 0351/65803-99
e-mail: info@bombastus-werke.de
Internet: www.bombastus.de

Anwendungsgebiete

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Hinweis: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fort dauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen

Keine bekannt.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie die Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

Hinweis für Diabetiker: Die Tabletten enthalten Milchzucker. Eine gesonderte Berücksichtigung der Kohlenhydratmenge ist für Diabetiker nicht erforderlich.

Hinweis für Zöliakie-Kranke: Dieses Arzneimittel ist glutenfrei.

Arzneimittel - Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Dosieranleitung, Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde je 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 - 3mal täglich je eine Tablette einnehmen.

Salben werden 1 - 2mal täglich auf die entsprechenden Hautbereiche aufgetragen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen

Bei der Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise zur Haltbarkeit und Aufbewahrung

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem aufgedruckten Verfalldatum.

Tabletten sind nach Anbruch 24 Monate verwendbar.

Salben sind nach Anbruch 6 Monate verwendbar.

Stand der Information

November 2005