

Liebe Patientin, lieber Patient !

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Essitol®

Wirkstoff: Aluminiumacetat-Tartrat

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Wirkstoff

1 g Aluminiumacetat-Tartrat

Sonstige Bestandteile: Croscarmellose-Natrium, Macrogol 6 000, Macrogol 20 000, hydriertes Rizinusöl

Darreichungsform und Inhalt

Essitol® ist in Packungen zu 10 Tabletten erhältlich.

Stoff- oder Indikationsgruppe/Wirkungsweise

Traditionelles Arzneimittel

Pharmazeutischer Unternehmer

athenstaedt Nachf. GmbH + Co. KG

Böcklinstraße 1, 80 638 München

Tel.: 0 89 - 159 186 - 0, Fax: 0 89 - 159 186 - 15

Hersteller: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben

Anwendungsgebiete

Die mit Hilfe der Essitol® Tabletten hergestellte, äußerlich anzuwendende Lösung wird traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel bei Prellungen und Verstauchungen sowie als mild wirkendes Arzneimittel bei übermäßiger Schweißbildung.

Hinweis: Sollten die Beschwerden bei Verstauchungen und Prellungen länger als eine Woche andauern oder treten Hautveränderungen auf, ist ein Arzt aufzusuchen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Essitol® Tabletten nicht anwenden?

Die Lösung darf nicht angewendet werden, wenn Sie bereits auf Aluminiumacetat-Zubereitungen oder einen sonstigen Bestandteil des Arzneimittels überempfindlich reagiert haben.

Die Lösung darf nicht auf offene Wunden aufgetragen werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass Essitol® nicht in der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden kann.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Deshalb soll Essitol® bei Kindern unter zwölf Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Essitol® Tabletten müssen vor der Anwendung, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, aufgelöst und verdünnt werden. Sollten die Beschwerden bei Verstauchungen und Prellungen länger als 1 Woche andauern, ist ein Arzt aufzusuchen.

Essitol® nicht mit Augen oder Schleimhäuten in Berührung bringen.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Essitol®?

Bei der gleichzeitigen Anwendung weiterer äußerlich anzuwendender Produkte kann es zu Wechselwirkungen kommen. Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Bitte halten Sie sich an die folgenden Anwendungsvorschriften, da Essitol® sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel und wie oft sollten Sie Essitol® Tabletten anwenden?

Für Umschläge und kühlende Verbände bei Prellungen und Verstauchungen zerkleinern Sie bitte 1-2 Tabletten mit einem Löffel und lösen Sie sie in einem Glas lauwarmem Wasser (ca. 100 bzw. 200 ml) unter mehrmaligem Umrühren auf. Mit der entstehenden Lösung tränken Sie den Umschlag. Lassen Sie den Umschlag nicht austrocknen und wechseln Sie ihn spätestens nach zwei Stunden.

Zur Verminderung einer übermäßigen Schweißbildung zerkleinern Sie bitte 1-2 Tabletten mit einem Löffel und lösen sie in einem Glas (ca. 20 bzw. 40 ml) lauwarmem Wasser unter mehrmaligem Umrühren auf. Mit dieser Lösung pinseln oder betupfen Sie dann die betroffenen Hautpartien.

Wie sollten Sie Essitol® Tabletten anwenden?

Essitol® Tabletten sind ausschließlich zur Bereitung einer Lösung zum äußerlichen Gebrauch, wie oben beschrieben, bestimmt und dürfen nicht eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Essitol® Tabletten anwenden?

Umschläge mit verdünnter Lösung sollten nur bis zum Abklingen der akuten Prellungs- und Verstauchungsbeschwerden angewendet werden.

Die mit Essitol® Tabletten hergestellten Lösungen zum Pinseln oder Betupfen bei übermäßiger Schweißbildung können langfristig angewendet werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Was ist zu tun, wenn Essitol® Tabletten in zu großen Mengen angewendet wurde?

Bei Anwendung ungenügend verdünnter Lösungen oder bei langfristiger Benutzung zu Umschlägen, insbesondere unter Luftabschluss, besteht die Gefahr von Hautschädigungen, unter Umständen bis zu schweren Gewebeschädigungen.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Essitol® Tabletten angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Führen Sie die Anwendung so bald wie möglich, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Wenn Sie die Anwendung unterbrechen oder vorzeitig beenden, kann die mit Essitol® Tabletten hergestellte Lösung nicht richtig wirken.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung mit Essitol® Tabletten auftreten?

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und bei Beachtung der Verdünnungsvorschriften sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Bei Anwendung ungenügend verdünnter Lösungen oder bei langfristiger Benutzung von Umschlägen, insbesondere unter Luftabschluss, besteht die Gefahr von Hautschädigungen unter Umständen bis zur Ausbildung von schweren Gewebeschädigungen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sollten Sie Hautveränderungen beobachten, ist das Präparat sofort abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Lasche der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

Juli 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eigenschaften

Essitol® Tabletten lassen sich problemlos anwenden, helfen rasch und sind gut hautverträglich; sie sind daher unentbehrlich überall dort, wo mit Verletzungen verschiedener Art und Insektenstichen zu rechnen ist, wie z. B. beim Wandern, Bergsteigen, Camping, bei Jagd- und Angelsport oder anderen sportlichen Betätigungen.

Auf Grund ihrer handlichen Packungsgröße lassen sich Essitol® Tabletten bequem im Reisegepäck mitführen.

Damit Sie stets auf die Ihnen gegebenen wichtigen Informationen zurückgreifen können, legen Sie bitte nach der Anwendung diese Gebrauchsinformation zusammen mit den Tabletten wieder in die Faltschachtel zurück.