

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation
aufmerksam. Sie enthält wichtige Infor-
mationen, die Sie bei der Anwendung dieses
Arzneimittels beachten sollten. Wenden
Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder
Apotheker.

Gebrauchsinformation

Pertussin® Sirup

Wirkstoff: Thymiankraut-Fluidextrakt

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

100 g (entsprechend 77,5 ml) Sirup enthalten:
8,0 g Fluidextrakt aus Thymiankraut (1:2-2,5),
Auszugsmittel: Ammoniaklösung 10% (m/m),
Glycerol 85%, Ethanol 90% (V/V), Wasser
(1:20:70:109)

Sonstige Bestandteile:

Citronensäure-Monohydrat, Sucrose, Gerei-
nigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung mit 240 g Sirup

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wir- kungsweise

Pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen
Erkrankungen der Atemwege

Pharmazeutischer Unternehmer

medphano Arzneimittel GmbH

Maienbergstraße 10-12

15562 Rüdersdorf bei Berlin

Tel.: (03 36 38) 7 49-0

Fax: (03 36 38) 7 49 77

Anwendungsgebiete

Erkältungskrankheiten der Atemwege mit
zähflüssigem Schleim, zur Besserung der
Beschwerden bei akuter Bronchitis.

Bei Beschwerden, die länger als eine Woche
anhalten oder bei Auftreten von Atemnot,
Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem
Auswurf, muss ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen-
über Thymian oder anderen Lamiaceen
(Lippenblütler), Birke, Beifuss, Sellerie oder
einem der sonstigen Bestandteile des Arz-
neimittels darf Pertussin® Sirup nicht angewendet
werden.

Pertussin® Sirup darf nicht eingenommen
werden, wenn Sie an der seltenen, erblichen
Fructose-Unverträglichkeit, einer Glucose-
Galactose-Malabsorption oder einem Sac-
charase-Isomaltase-Mangel leiden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Was müssen Sie in Schwangerschaft und
Stillzeit beachten?

Pertussin® Sirup soll wegen nicht aus-
reichender Untersuchungen in Schwanger-
schaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Zwei zur Marke 15 ml gefüllte Messbecher
(= 30 ml) enthalten insgesamt 23,68 g Sucrose
(Zucker) entsprechend ca. 2 Broteinheiten
(BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten
müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Dieses Arzneimittel enthält 4 Vol.-% Alkohol.
Bei Beachtung der Dosierungsanleitung
werden bei jeder Einnahme bei Kindern von
1-<4 Jahren 0,32 g Alkohol, bei Kindern
von 4-12 Jahren bis zu 0,48 g Alkohol und
bei Heranwachsenden ab 12 Jahren und
Erwachsenen bis zu 0,95 g Alkohol zugeführt.
Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei
Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern,
Patienten mit organischen Erkrankungen des
Gehirns, Schwangeren und Stillenden. Die Wir-
kung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt
oder verstärkt werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen
Ihr Arzt Pertussin® Sirup nicht anders verord-
net hat. Bitte halten Sie sich an die Anwen-
dungsvorschriften, da Pertussin® Sirup sonst
nicht richtig wirken kann.

Wie viel Pertussin® Sirup sollten Sie ein-
nehmen und wie oft?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen
Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren 3-4
mal täglich zweimal den zur Marke 15 ml
gefüllten Messbecher (= 30 ml) mit etwas
Flüssigkeit (z. B. 1/2 Glas Wasser) ein;
Graduierung des Messbechers beachten!

Kleinkinder (1-<4 Jahre) erhalten 3 mal täglich den zur Marke 10 ml gefüllten Messbecher mit etwas Flüssigkeit (z.B. 1/2 Glas Wasser).

Kinder (4-12 Jahre) nehmen 4 mal täglich den zur Marke 15 ml gefüllten Messbecher mit etwas Flüssigkeit (z. B. 1/2 Glas Wasser) ein. Die Flasche vor dem Gebrauch schütteln!

Wie lange sollten Sie Pertussin® Sirup einnehmen?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Verlauf der Erkrankung und ist vom Arzt zu bestimmen. Beachten Sie bitte in jedem Fall die Angaben unter „Anwendungsgebiete“ und „Nebenwirkungen“.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Sie Pertussin® Sirup in zu großen Mengen angewendet haben (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Vergiftungen mit Pertussin® Sirup sind bisher nicht bekannt geworden. Bei Einnahme zu großer Mengen von Pertussin® Sirup können die unter „Nebenwirkungen“ beschriebenen Beschwerden möglicherweise verstärkt auftreten. In diesem Fall benachrichtigen Sie bitte einen Arzt. Dieser kann über gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Pertussin® Sirup eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge Pertussin® Sirup ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Pertussin® Sirup auftreten?

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen wie z. B. Luftnot, Hautausschläge, Nesselsucht sowie Schwellungen in Gesicht, Mund- und/oder Rachenraum auftreten.

Sehr selten kann es auch zu Magenbeschwerden wie Krämpfen, Übelkeit, Erbrechen kommen.

Bei Auftreten von Nebenwirkungen sollte das Präparat abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden. Dieser kann über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Pertussin® Sirup nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Pertussin® Sirup aufzubewahren?

Nicht über 25 °C und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses:

Die Haltbarkeit nach Anbruch des Behältnisses beträgt 3 Wochen.

Wann ist Pertussin® Sirup auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr zu verwenden?

Das Arzneimittel sollte nicht mehr eingenommen werden, wenn der Inhalt eine deutliche Trübung zeigt.

Stand der Information

August 2005

Zusätzliche Informationen über Eigenschaften des Arzneimittels

Pertussin® Sirup enthält einen alkoholhaltigen Extrakt aus Thymiankraut. Zubereitungen aus Thymian werden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege angewandt, können zu einer Verflüssigung von zähem Bronchialsekret und zu einer Entkrampfung der Bronchialmuskulatur beitragen und das Abhusten erleichtern. Aufgrund des Gehaltes an ätherischem Öl (Thymol) besitzt Pertussin® Sirup den typischen Thymianduft.

Pertussin® Sirup erhalten Sie exklusiv in Ihrer Apotheke.

475A0003

7100146/1105