

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei

Lösung

Wirkstoff: Purpursonnenhutkraut-Presssaft, getrocknet 3,75 g/100 g

### Zusammensetzung

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*

100 g Lösung enthalten 3,75 g getrockneter Presssaft aus frischem, blühenden Purpursonnenhutkraut (22–65 : 1).

*Sonstige Bestandteile:*

Kaliumsorbat (0,2 g/100 g Lösung), Citronensäure, gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Inhalt

Originalpackung zu 50 ml Lösung

Originalpackung zu 100 ml Lösung

### Stoff- oder Indikationsgruppe

Pflanzliches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

*Pharmazeutischer Unternehmer:*

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

www.ratiopharm.de

*Hersteller:*

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren

www.merckle.de

### Anwendungsgebiete

Unterstützende Behandlung häufig wiederkehrender (rezidivierender) Infekte im Bereich der Atemwege und ableitenden Harnwege.

Infekte im Bereich der Atemwege:

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem oder blutigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Infekte im Bereich der Harnwege:

Bei Blut im Urin, bei Fieber oder bei Anhalten der Beschwerden über 5 Tage sollte ein Arzt aufgesucht werden.

### Gegenanzeigen

**Wann dürfen Sie ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei nicht einnehmen?**

ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei ist bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbblütler nicht anzuwenden.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei nicht eingenommen werden bei progredienten Systemerkrankungen (fortschreitenden Allgemeinerkrankungen) wie Tuberkulose, Leukosen (Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen), Kollagenosen (entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes), Multiple Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektionen (Infektionen mit dem AIDS-Virus), chronischen Viruserkrankungen und Autoimmunerkrankungen (gegen körpereigenes Gewebe gerichtete Erkrankungen).

### **Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?**

Wegen nicht ausreichender Untersuchungen soll das Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?**

Wegen nicht ausreichend vorliegenden Untersuchungen mit diesem Arzneimittel bei Kindern unter 6 Jahren soll dieses Arzneimittel bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

**Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei?**

Keine bekannt

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei sonst nicht richtig wirken kann.

### **Wie viel und wie oft sollten Sie ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei einnehmen?**

Kinder von 6–11 Jahren

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Kinder von 6–11 Jahren 3–4-mal täglich 2 ml Lösung ein (entsprechend 2 g).

Heranwachsende ab 12 Jahren und Erwachsene

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Heranwachsende ab 12 Jahren und Erwachsene 3–4-mal täglich 3 ml Lösung ein (entsprechend 3 g).

Zur exakten Dosierung ist ein geeigneter Messbecher beige packt.

3 ml ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei entsprechen 2,1 ml Presssaft.

### **Wie lange sollten Sie ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei einnehmen?**

Nicht länger als 2 Wochen hintereinander einnehmen.

### **Überdosierung und andere Anwendungsfehler**

**Was ist zu tun, wenn ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei in zu großen Mengen eingenommen wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Von den pflanzlichen Bestandteilen sind keine Vergiftungserscheinungen zu erwarten.

### **Nebenwirkungen**

**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei auftreten?**

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitung aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Aufgrund des Gehaltes an Kaliumsorbat können bei entsprechend veranlagten Patienten Reizerscheinungen, wie Schleimhautirritationen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Treten Nebenwirkungen auf, sollte das Arzneimittel abgesetzt und ein Arzt aufgesucht werden.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und dem Flaschenetikett aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch ist die Lösung 8 Wochen haltbar.

Die bei Naturstoffpräparaten gelegentlich auftretenden Nachtrübungen bzw. Ausflockungen beeinträchtigen die Wirkung nicht.

### **Wie ist ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei aufzubewahren?**

Nicht über 25 °C lagern!

### **Stand der Information**

März 2005

---

Achten Sie stets darauf ECHINACEA-ratiopharm® Liquid alkoholfrei so aufzubewahren, dass dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist.

---

Versionscode: Z05