



Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.

GEBRAUCHSINFORMATION

Stoma-Gastreu® S R5

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 ml enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Anacardium Dil. D6 1 ml, Belladonna Dil. D4 1 ml, Lycopodium Dil. D5 1 ml, Carbo vegetabilis Dil. D8 1 ml, Chamomilla Dil. D2 1 ml. Die arzneilich wirksamen Bestandteile 1-3 werden über die letzten beiden Stufen gemeinsam potenziert. Sonstige Bestandteile: Ethanol 30 % (m/m).
(1 ml entspricht 18 Tropfen)

22ml / 50ml Mischung flüssiger Verdünnungen zum Einnehmen.

Stoff- und Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Verdauungsorgane.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim
Tel.: 06251 / 1097-0 · Fax: 06251 / 3342
<http://www.reckeweg.de>

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von Magenbeschwerden.

Hinweis: Bei allen unklaren und plötzlich einsetzenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Kamille und andere Korbblütler.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was ist in Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Zur Anwendung von **Stoma-Gastreu[®] S R5** in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. **Stoma-Gastreu[®] S R5** soll deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Fieber, Schwarzfärbung des Stuhls sowie bei anhaltenden Durchfällen ist ein Arzt aufzusuchen.

Warnhinweis: Enthält 40 Vol.-% Alkohol.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Auch die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet: 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren. Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

Aufbewahrung:

Nicht über 25°C aufbewahren.

Stand der Information: April 2005

Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6276506.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.