



3. WIE IST BEPANTHEN® LÖSUNG ANZUWENDEN?

Wenden Sie Bepanthen® LÖSUNG immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Tragen Sie Bepanthen® LÖSUNG ein bis mehrmals täglich unverdünnt auf die betroffenen Stellen auf oder wenden Sie sie in Form von Spülungen oder Umschlägen an. Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung. Wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Bepanthen® LÖSUNG Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich:	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	weniger als 1 von 1.000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	weniger als 1 von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bedeutsame Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Bepanthen® LÖSUNG nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf. In seltenen Fällen sind Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. allergische Hautreaktionen) beobachtet worden.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat) können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST BEPANTHEN® LÖSUNG AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung

Das Verfallsdatum dieser Packung steht auf der Faltschachtel sowie auf dem Etikett der Flasche. Nach diesem Datum sollten Sie das Arzneimittel nicht mehr verwenden. Bepanthen® LÖSUNG sollte nach Anbruch nicht länger als 30 Tage angewendet werden.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was enthält Bepanthen® LÖSUNG:

Der Wirkstoff ist: Dexpanthenol (1 ml Lösung enthält 50,0 mg Dexpanthenol)

Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumbenzoat; Methyl(4-hydroxybenzoat); Propyl(4-hydroxybenzoat); (3R)-3-Hydroxy-4,4-dimethylloxolan-2-on; Wasser für Injektionszwecke.

Wie sieht Bepanthen® LÖSUNG aus und Inhalt der Packung:

Bepanthen® LÖSUNG ist in einer Glasflasche zu 50 ml erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Bayer Vital GmbH, D-51368 Leverkusen

Hersteller:

GP Grenzach Produktions GmbH, Emil-Barell-Straße 7, D-79639 Grenzach-Wyhlen



Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet am:

Juni 2006 / D4



Bepanthen

Lesen Sie die Packungsbeilage für alle Informationen zu Bepanthen® LÖSUNG. Beachten Sie die folgenden Punkte: • Bepanthen® LÖSUNG enthält Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat), die Allergien auslösen können. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie allergisch gegen Salicylate, Aspirin oder andere Salicylate sind. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Nierenerkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Lebererkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Gallenblasen- oder Gallenwegenerkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Diabeteserkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Bluthochdruck-Erkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Herz-Kreislauferkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Bluterkrankung haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Eisenmangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-B12-Mangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-K-Mangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-D-Mangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-E-Mangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-K-Mangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-D-Mangelanämie haben. • Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie eine Vitamin-E-Mangelanämie haben.



10100006

