

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an Ihre Apotheke.

1A
PHARMA

Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma

Wirkstoff: Clotrimazol

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 g Creme enthält 10 mg Clotrimazol.

Sonstige Bestandteile:

Benzylalkohol, Hexadecylpalmitat, Cetylstearylalkohol (Ph.Eur.), dickflüssiges Paraffin, Polysorbitat 60, Sorbitanstearat, gereinigtes Wasser.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 20 g (N1) und 50 g (N2) Creme

Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma ist ein Mittel gegen Pilzkrankungen der Haut.

1 A Pharma GmbH Hersteller
Keltenring 1 + 3 SALUTAS Pharma GmbH
82041 Oberhaching Otto-von-Guericke-Allee 1
Tel.: 089/6138825-0 39179 Barleben

Anwendungsgebiete

Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut durch Dermatophyten, Hefen (z. B. Candida-Arten), Schimmelpilze und andere wie *Malassezia furfur* sowie Infektionen durch *Corynebacterium minutissimum*.

Diese Infektionen können vorkommen als Pilzinfektionen der Füße, der Haut und Hautfalten, oberflächliche Hefepilzkrankungen (Candidosen), Kleinpilzflechte (*Pityriasis versicolor*) oder Erythrasma (durch bestimmte Bakterien hervorgerufene Erkrankung).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie *Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma* nicht anwenden?

Sie dürfen *Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma*

nicht anwenden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie überempfindlich auf den Wirkstoff Clotrimazol reagieren bzw. auf verwandte Stoffe (Imidazole-derivate) oder einen der sonstigen Bestandteile.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft beachten?

Sie sollten die Creme in der Frühschwangerschaft nicht anwenden, da es Hinweise auf eine erhöhte Fehlgeburtsrate nach vaginaler Anwendung von Clotrimazol in den ersten 3 Monaten der Schwangerschaft gibt.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Keine

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von *Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma*?

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewendete Arzneimittel gelten können.

Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma vermindert die Wirksamkeit von anderen Arzneimitteln, die ebenfalls zur Behandlung von Pilzkrankungen angewendet werden (Amphotericin und andere Polyantibiotika wie Nystatin und Natamycin).

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit der Arzt *Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma* nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da *Clotrimazol*

1 % Creme - 1 A Pharma sonst nicht richtig wirken kann.

In welcher Menge und wie oft sollten Sie Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma anwenden?

Sie tragen die Creme 2-3mal täglich auf die erkrankten Hautstellen dünn auf.

Es genügt meistens eine kleine Menge Creme (ca. ½ cm Stranglänge) für eine etwa handtellergroße Fläche.

Wie sollten Sie Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma anwenden?

Reiben Sie die Creme leicht in die Haut ein.

Wenn Sie eine Fußpilzkrankung mit der Creme behandeln, sollten die Füße nach jedem Waschen gründlich abgetrocknet werden (Zehenzwischenräume).

Wie lange sollten Sie Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach der Erkrankungsart und ist unterschiedlich lang. Wichtig für einen Erfolg der Behandlung ist die regelmäßige und ausreichend lange Anwendung der Creme.

Um eine vollständige Ausheilung zu erreichen, sollten Sie die Behandlung mindestens 4 Wochen lang durchführen, auch wenn Sie den Eindruck haben, dass die akute Entzündung vorbei ist und Ihre Beschwerden nachlassen.

Eine Kleinpilzflechte (Pityriasis versicolor) heilt im Allgemeinen in 1-3 Wochen und ein Erythrasma in 2-4 Wochen ab.

Bei Fußpilz sollten Sie die Creme noch ca. 2 Wochen lang anwenden, auch wenn Ihre Beschwerden schon nach wenigen Tagen nachlassen oder verschwunden sind.

Anwendungsfehler und Überdosierung
Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden?

Bei nicht ausreichend langer Behandlung kann sich die Pilzkrankung erneut ausbreiten oder wieder auftreten (Rückfall).

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Clotrimazol 1 % Creme - 1 A Pharma auftreten?

Gelegentlich können Hautreizungen (z. B. Brennen, Stechen) vorkommen.

Bei Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol können allergische Reaktionen an der Haut auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Die Haltbarkeit nach Anbruch beträgt 6 Monate.

Stand der Information

Februar 2005

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel unzugänglich für Kinder auf!

1 A Pharma GmbH wünscht gute Besserung!

586574