

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Kamillosan® Creme



Wirkstoff: Kamillenblüten-Auszug

ZUSAMMENSETZUNG

1 g Creme enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

Auszug aus Kamillenblüten (2,7-5,5 : 1) 20 mg

Auszugsmittel: Ethanol 95,4 % (V/V)

(enthaltend 0,22 % Natriumacetat und 0,12 % Natriumhydroxid)

Sonstige Bestandteile:

Methyl-4-hydroxybenzoat, Propyl-4-hydroxybenzoat, Cetylstearylalkohol, hydriertes Erdnussöl, Wollwachsalkohole, Glycerol-(mono, di, tri)fettsäureester-Natriumcetylstearylsulfat-Gemisch, Isopropyltetradecanoat, Glycerol, gereinigtes Wasser

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

Originalpackungen mit 20 g (N1), 40 g (N2) und 100 g (N3) Creme

Klinikpackungen

Pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei entzündlichen Hautveränderungen

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER UND HERSTELLER

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstraße 1

61352 Bad Homburg

Telefon (06172) 888-01

Telefax (06172) 888-2740

MEDA

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Nachbehandlung im Anschluss an eine lokale Kortikoidtherapie entzündlicher Hauterkrankungen, u.a. verschiedener Ekzemformen wie z. B.:

- Kontaktekzem
- Gewerbeekzem
- Ekzem bei Kindern
- Neurodermitis (atopisches Ekzem)

Kamillosan Creme empfiehlt sich aufgrund ihrer Verträglichkeit auch zur Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern.

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie Kamillosan Creme nicht anwenden?

Kamillosan Creme darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Kamille, andere Korbblütler, Parabene (Alkyl-4-hydroxybenzoate), Wollwachsalkohol, Cetylstearylalkohol oder einem der sonstigen Bestandteile von Kamillosan Creme sind.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Cetylstearylalkohol und Wollwachsalkohole können örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kontaktdermatitis) hervorrufen.

Was ist bei Schwangerschaft und Stillzeit zu beachten?

Kamillosan Creme sollte in der Stillzeit nicht im Bereich der Brustwarzen angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu beachten?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Neugeborenen liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Daher wird die Anwendung von Kamillosan Creme für Säuglinge, die noch keine 4 Wochen alt sind, nicht empfohlen.

DE 5634 8018
40270.4

WECHSELWIRKUNGEN

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Kamillosan Creme oder werden durch dieses Medikament beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kamillosan Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Kamillosan Creme sonst nicht richtig wirken kann.

Wie und wie oft sollten Sie Kamillosan Creme anwenden?

Kamillosan Creme wird 3-mal täglich dünn auf die Haut aufgetragen.

Sobald sich das Krankheitsbild gebessert hat, genügt eine 2-mal tägliche Anwendung.

Wie lange sollten Sie Kamillosan Creme anwenden?

Die Dauer der Anwendung ist nicht zeitlich begrenzt.

NEBENWIRKUNGEN

Wie alle Arzneimittel kann Kamillosan Creme Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten Weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten 1 Fall oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Kontaktallergie) auftreten, wegen sogenannter Kreuzreaktionen auch bei Personen mit Überempfindlichkeit gegen andere Korbblütler (z. B. Beifuß, Schafgarbe, Arnika, Chrysantheme, Margerite) oder bei Überempfindlichkeit gegenüber Bestandteilen der Cremegrundlage (siehe Gegenanzeigen).

Sehr selten sind ferner bei Schleimhautkontakt schwere allergische Reaktionen (Asthma, Kreislaufkollaps, allergischer Schock) nach Anwendung von flüssigen Kamillenzubereitungen beobachtet worden.

Methyl- und Propyl-4-hydroxybenzoat kann Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Bei Auftreten entsprechender Anzeichen wie z.B. Hautrötungen, ggf. verbunden mit Juckreiz, beenden Sie bitte die Anwendung von Kamillosan Creme und suchen ggf. Ihren Arzt auf.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES ARZNEIMITTELS

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Behältnis und der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch nicht länger als 12 Monate anwenden.

ARZNEIMITTEL SIND FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFZUBEWAHREN!

Stand der Information: November 2007

Wir wünschen gute Besserung!

Kamillosan® Creme

enthält die besonders wirkstoffreiche Kamillensorte **Manzana®** in einer Cremegrundlage. Sie wurde speziell für Kamillosan gezüchtet und patentiert.

Kamillosan® Creme ist apothekenpflichtig.