
Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation, bevor Sie mit der Anwendung von **Duofilm** beginnen.
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren Arzt oder Apotheker.

Duofilm

Lösung gegen Warzen



Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

10 g Lösung enthalten: 1,67 g 2-Hydroxybenzoesäure (Salicylsäure) und 1,67 g Milchsäure.

Sonstige Bestandteile

Kolophonium, Raffiniertes Rizinusöl, Collodium (bestehend aus Pyroxilin, Ethanol, Ether, Wasser).

Darreichungsform und Inhalt

Flasche mit 15 ml Lösung

Pharmazeutischer Unternehmer

Stiefel Laboratorium GmbH, Mühlheimer Straße 231, 63075 Offenbach/Main

Hersteller

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Finisklin Industrial Estate, Sligo, co. Sligo, Irland

Anwendungsgebiet

Vulgäre Warzen

Gegenanzeigen

Nicht anzuwenden bei Patienten, deren Überempfindlichkeit gegen einen oder mehrere der Inhaltsstoffe bekannt ist. Nicht im Gesicht oder Genitalbereich anwenden! Keine Anwendung bei Säuglingen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Nur zur äußerlichen Anwendung!

Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen!

Schwangerschaft und Stillzeit:

Längerer Gebrauch von Duofilm während der Schwangerschaft und Stillzeit sollte vermieden werden. Zur Behandlung von vulgären Warzen sollte eine Behandlungsfläche von 5 cm² nicht überschritten werden. Keine Anwendung im Brustbereich während der Stillzeit.

Bei Kleinkindern: Langzeitbehandlung auf großen Flächen vermeiden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

2-Hydroxybenzoesäure (Salicylsäure) kann die Aufnahme anderer, an derselben Stelle aufgetragener Arzneimittel verstärken. Vom Körper aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird Duofilm Lösung 2 - 4 mal täglich auf die Warze(n) aufgetragen. Vor dem erneuten Auftragen sollte der vorhandene Film durch Abziehen oder Abrubbeln entfernt werden.

Duofilm Lösung sollte nicht auf die gesunde Haut in der Umgebung der Warze gelangen.

Bei regelmäßiger Anwendung läßt sich die erweichte Hornschicht nach einigen Tagen mühelos entfernen.

Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die Warze abgetragen ist oder abfällt.
Warzen sind übertragbar!

Um eine Infektionsausbreitung zu verhindern, sollte das eigene Handtuch nie zur Mitbenutzung an andere weitergegeben werden. Bei Vorhandensein von Fußwarzen nicht barfuß gehen!

Dauer der Anwendung

Die Anwendung von Duofilm-Warzenlösung über einen Zeitraum von 6 - 12 Wochen ist im Normalfall ausreichend.

Nebenwirkungen

Duofilm ruft gelegentlich leichtes und bei häufigerem Auftragen auch stärkeres Brennen besonders auf der die Warze umgebenden gesunden Haut hervor.

Im Falle übermäßiger Reizung sollte die Behandlung zwischenzeitlich unterbrochen werden und nach Abklingen der Reaktion wieder aufgenommen werden.

Aufgrund des Gehaltes an 2-Hydroxybenzoesäure (Salicylsäure) können bei Anwendung dieses Arzneimittels bei entsprechend veranlagten Patienten leichte Reizerscheinungen, wie Hautentzündungen (Dermatitis) auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise

Von offenem Feuer fernhalten!

Nicht über 25°C aufbewahren!

Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach Ablauf des auf der Flasche und der äußeren Umhüllung angegebenen Verfalldatums!

Stand der Information: Mai 2003

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Stiefel Laboratorium GmbH, Mühlheimer Straße 231, 63075 Offenbach/Main