

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker



Gebrauchsinformation

Hepathrombin[®]-Gel 30 000

Wirkstoff: Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein)

ZUSAMMENSETZUNG

100 g Hepathrombin-Gel 30000 enthalten

Arzneilich wirksame Bestandteile:

30000 I.E. Heparin-Natrium (Mucosa vom Schwein)

Sonstige Bestandteile:

Allantoin, Carbomer 980, Citronenöl, Dexpanthenol, Edetinsäure Dinatriumsalz 2 H₂O, Kiefernadelöl, Levomenthol, Poly(oxyethylen)-6-glycerol(mono,di)alkanoat (C8-C10), Polysorbat 80, Propan-2-ol, Sorbitol-Lösung 70% (nicht-kristallisierend), Trometamol, gereinigtes Wasser.

DARREICHUNGSFORM UND INHALT

N2 100g Gel

N3 150g Gel

ZUR VERMINDERUNG VON SCHWELLUNGEN

PHARMAZEUTISCHER UNTERNEHMER

Teofarma srl - Via F.lli Cervi, 8 - I-27010 Valle Salimbene - Pavia

HERSTELLER

Teofarma srl - Viale Certosa 8/A - I-27100 Pavia

Tel. 0039.0382.422008 - Fax 0039.0382.525845

e-mail: servizioclienti@teofarma.it

ANWENDUNGSGEBIETE

Zur unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen (Prellungen/Blutergüsse).

GEGENANZEIGEN

Wann dürfen Sie Hepathrombin-Gel 30000 nicht anwenden?

Dieses Arzneimittel soll nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Hepathrombin-Gel 30000 bzw. Gelgrundlage.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bisherige Erfahrungen mit der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden haben keine Anhaltspunkte für schädigende Wirkungen ergeben.

Heparin ist nicht plazentagängig und tritt nicht in die Muttermilch über.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ANWENDUNG UND WARNHINWEISE

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Hepathrombin-Gel 30000 soll nicht auf offene Wunden und/oder nässende Ekzeme aufgebracht werden.

WECHSELWIRKUNGEN MIT ANDEREN MITTELN

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Hepathrombin-Gel 30000?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bei örtlicher Anwendung nicht bekannt.

DOSIERUNGSANLEITUNG, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Hepathrombin-Gel 30000 nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Hepathrombin-Gel 30000 sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von Hepathrombin-Gel 30000 und wie oft sollten Sie Hepathrombin-Gel 30000 anwenden?

Hepathrombin-Gel 30000 soll 2-3 mal täglich dünn und gleichmäßig auf das Erkrankungsgebiet aufgetragen werden.

Wie lange sollten Sie Hepathrombin-Gel 30000 anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der Arzt.

Wenn nicht anders verordnet, sollten Sie Hepathrombin-Gel 30000 ca. 1-2 Wochen anwenden.

NEBENWIRKUNGEN

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Hepathrombin-Gel 30000 auftreten?

Allergische Reaktionen auf Heparin bei Anwendung auf der Haut sind sehr selten. Jedoch können in Einzelfällen allergische Reaktionen wie Rötung der Haut und Juckreiz auftreten, die nach Absetzen des Präparates in der Regel rasch verschwinden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Hepathrombin-Gel 30000 sollte bei Auftreten von allergischen Hautreaktionen abgesetzt werden. Bitte informieren Sie hiervon Ihren Arzt. Darüber hinaus sind keine weiteren besonderen Maßnahmen notwendig.

HINWEISE UND ANGABEN ZUR HALTBARKEIT DES ARZNEIMITTELS

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel aufgedruckt.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Achten Sie stets darauf, Hepathrombin-Gel 30000 so aufzubewahren, daß es für Kinder nicht zu erreichen ist!

STAND DER INFORMATION

Oktober 2001

Liebe Patientin, lieber Patientin.

Hepathrombin-Gel 30000 ist ein Arzneimittel, das bei der unterstützenden Behandlung bei akuten Schwellungszuständen nach stumpfen Verletzungen, wie z.B. Prellungen, Blutergüsse, Quetschungen, Stauchungen und Zerrungen durch Sport- und Unfallverletzungen, angezeigt ist. Es baut die durch diese Erkrankungen bedingten Entzündungen und Stauungen im Gewebe ab.

Sie können sich die Wirkungsweise folgendermaßen vorstellen:

Die Haut nimmt die Hepathrombin-Wirkstoffe rasch auf. Der Wirkstoff Heparin wird im Unterhautgewebe gespeichert. Von dort aus wird er an die umgebenden Gewebe und auch durch die Wände feinsten Blutgefäße weitergegeben. Die Durchblutung wird verbessert. Außerdem begünstigt Heparin das Ausschwemmen rückgestauter Gewebeflüssigkeit sowie störender Stoffwechselprodukte. Entzündungserscheinungen klingen ab.

Was darüber hinaus beachtet werden sollte, sagt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker.

Zuletzt noch ein wichtiger Punkt:

Hepathrombin-Gel 30000 hat sich als sehr angenehm in der Anwendung erwiesen. Denn Hepathrombin-Gel 30000 klebt nicht, fettet nicht, riecht angenehm und hinterläßt keine Rückstände auf Wäsche und Strümpfen.

