

III

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

MUCOKEHL® D5 Flüssige Verdünnung

Homöopathisches Arzneimittel · Wirkstoff: *Mucor racemosus* D5

Zusammensetzung:

10 ml flüssige Verdünnung enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil:

10 ml *Mucor racemosus* D5 dil. (HAB, Vorschrift 5a).

Darreichungsform und Inhalt: 10 ml / 100 ml (10x10 ml) flüssige Verdünnung zum Einnehmen, Inhalieren und Einreiben.



Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

SANUM-KEHLBECK
GmbH & Co. KG

Arzneimittelherstellung
Postfach 1355 · D-27316 Hoya

Anwendungsgebiete: Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.

Hinweis an den Anwender: Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen sollte medizinischer Rat eingeholt werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie MUCOKEHL® D5 nicht anwenden?

Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (*Mucor racemosus*).

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Siehe unter Punkt Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Keine bekannt.

III



Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen der Arzt nichts anderes verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da dieses Arzneimittel sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie MUCOKEHL® D5 anwenden?
Soweit nicht anders verordnet:

- Zum Einnehmen:** Einmal täglich 8 Tropfen vor einer Mahlzeit.
- Zum Inhalieren:** Zwei- bis dreimal täglich 10-20 tiefe Atemzüge.
- Zum Einreiben:** a) Einmal täglich 5-10 Tropfen am Ort der Erkrankung oder in die Ellenbeuge einreiben; b) bei Injektionsbehandlung an den injektionsfreien Tagen zweimal wöchentlich 5-10 Tropfen.

Wie lange sollten Sie MUCOKEHL® D5 anwenden?
Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.





Nebenwirkungen: Keine bekannt.
Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum ist auf dem Flaschenetikett und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! – Das Arzneimittel darf nach Öffnung der Flasche höchstens noch 2 Monate verwendet werden. – Bitte verschließen Sie die Flasche sofort nach Gebrauch. Berühren Sie die Tropfmontur nach Entfernung der Abdeckkappe nicht an der Spitze; unsachgemäße Behandlung verkürzt die Haltbarkeit des Arzneimittels. – Falls die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe oder flockig aussieht, soll das Arzneimittel auch vor Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwendet werden.

Stand der Gebrauchsinformation: 01. 11. 2002.

Hinweis: Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!



Zur weiteren Anwendung stehen **MUCOKEHL®** Augentropfen, Kapseln, Tabletten, Zäpfchen, Salbe und Injektionen zur Verfügung.



400TRD5GIDE703