



### Gebrauchsinformation

Liebe Eltern, liebe Anwender dieses Arzneimittels!  
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollten. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Dentinox<sup>®</sup>-Gel N

### Zahnungshilfe



#### Zusammensetzung:

10 g Gel enthalten als arzneilich wirksame Bestandteile:  
Tinktur aus Kamillenblüten (1:5), Auszugsmittel: Ethanol 70% (V/V) 1500 mg, Lidocainhydrochlorid 1 H<sub>2</sub>O 34 mg, Macrogollaurylether 32 mg.  
Sonstige Bestandteile: Sorbitol, Xylitol, Propylenglycol, Carbomer 974 P, Natriumhydroxid-Lösung (10%), Polysorbat 20, Edefinsäure, Dinatriumsalz 2 H<sub>2</sub>O, Saccharin-Natrium, Levomenthol, Gereinigtes Wasser.  
10 g enthalten 1 g Sorbitol (entspricht 0,25 g Fructose), entsprechend weniger als 0,1 Broteinheiten. Der Kalorienwert beträgt 2,6 kcal/g Sorbitol.

#### Darreichungsform und Inhalt:

Gel zur Anwendung in der Mundhöhle. Originalpackung mit 10 g.  
Dentinox-Gel N Zahnungshilfe ist ein Traditionelles Arzneimittel.

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk&Schuppan KG  
Nunsdorfer Ring 19 12277 Berlin  
Tel.: (0 30) 7200340 Fax.: (0 30) 7211038

#### Anwendungsgebiete:

Traditionell angewendet als mild wirkendes Arzneimittel zur kurzzeitigen Linderung der Beschwerden bei der ersten Zahnung. Treten stärkere Zahnfleischrötungen und -schwellungen oder ausgeprägte Begleitbeschwerden auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Dentinox-Gel N Zahnungshilfe nicht anwenden?*  
Dentinox-Gel N Zahnungshilfe darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Kamille, anderen Korbblütlern, Lidocain oder verwandten örtlichen Betäubungsmitteln (Lokalanästhetika vom Amidtyp), oder gegenüber einem der anderen Wirkstoffe und sonstigen Inhaltsstoffe des Arzneimittels.  
Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehalts an Sorbitol ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden, erbten Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructose-Intoleranz).

#### Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung und Warnhinweise:

Der Kontakt von Dentinox-Gel N Zahnungshilfe mit den Augen ist zu vermeiden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

#### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

*Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Dentinox-Gel N Zahnungshilfe nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da die Wirksamkeit von Dentinox-Gel N Zahnungshilfe sonst nicht gewährleistet ist.*

*Wie viel und wie oft sollten Sie Dentinox-Gel N Zahnungshilfe anwenden?*  
Bei Zahnungsbeschwerden wird ein erbsengroßes Stück Gel auf die betroffene Stelle des Zahnfleischs aufgetragen und leicht einmassiert. Die Anwendung sollte 2-3 mal täglich wiederholt werden.





1 g enthält 100 mg Sorbitol, 25 mg Fructose entsprechend. Der Kalorienwert beträgt 2,6 kcal/g Sorbitol.

**Wie und wann sollten Sie Dentinox-Gel N Zahnungshilfe anwenden?**  
Dentinox-Gel N Zahnungshilfe wird mit einem sauberen Finger oder sauberen Wattestäbchen auf die betroffene Stelle des Zahnfleisches aufgetragen und leicht einmassiert, insbesondere nach den Mahlzeiten und vor dem Einschlafen.

**Wie lange sollten Sie Dentinox-Gel N Zahnungshilfe anwenden?**  
Die Anwendung von Dentinox-Gel N Zahnungshilfe erfolgt bei Bedarf. Sie kann bis zum Durchtritt aller Milchzähne einschließlich der späteren Backenzähne fortgesetzt werden. Beachten Sie bitte die Angaben unter 'Anwendungsgebiete'.

**Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Dentinox-Gel N Zahnungshilfe auftreten?  
Insbesondere aufgrund des Lidocaingehalts können allergische Reaktionen auftreten. Bei Auftreten von Überempfindlichkeitsreaktionen an Haut oder Schleimhäuten ist die Anwendung von Dentinox-Gel N Zahnungshilfe zu beenden und ggf. ein Arzt aufzusuchen. Falls Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist auf der Tube und auf dem Umkarton aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!  
Haltbarkeit nach Anbruch der Tube: 12 Monate.  
Bewahren Sie Dentinox-Gel N Zahnungshilfe bitte dicht verschlossen und nicht über 25°C auf.

**Stand der Information:** Februar 2002

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

**Liebe Eltern,**

Sie haben eine gute Wahl getroffen und sich für Dentinox-Gel N Zahnungshilfe entschieden. Es gibt Ihnen die Sicherheit eines über lange Zeit bewährten, millionenfach verwendeten Arzneimittels. Es hilft, die Beschwerden beim Durchtritt der ersten Zähnchen und des gesamten Milchgebisses einschließlich der späteren Backenzähne zu erleichtern. Dentinox-Gel N Zahnungshilfe ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Arzneimittel, das speziell für Babys entwickelt wurde. Das gut haftende Gel wirkt lokal genau dort, wo das durchbrechende Zähnchen Probleme bereitet. Dentinox-Gel N Zahnungshilfe enthält einen Auszug aus Kamillenblüten, der sich besonders bei Entzündungen im Mund bewährt hat. Kamille gilt traditionell als entzündungshemmend, wundheilungsfördernd und leicht desinfizierend. Neben diesem pflanzlichen Wirkstoff enthält das Präparat zwei lokal schmerzlindernde Zusätze in babygerechter Dosierung. Dentinox-Gel N Zahnungshilfe enthält weder Farb- noch Konservierungsstoffe. Es ist zuckerfrei und enthält statt dessen den karieshemmenden Zuckeraustauschstoff Xylit. Dieser führt zu einem neutralen pH-Wert in der Mundhöhle und trägt so bei den gerade hervorkommenden Zähnchen zum Schutz vor Karies bei. Vergessen Sie bitte nicht, bereits die ersten Zähnchen babygerecht zu pflegen, denn sie sind Platzhalter für die weiteren Zähne. Ihr Apotheker und Kinderarzt werden Sie gern beraten. Die Zahngesundheit Ihres Kindes liegt in Ihren Händen.

Dentinox - für Zähnchen alles Gute.  
Ihre Dentinox KG Berlin



**Dentinox**

M06-078-03 PD/DE/V1/05.2007