

Tannolact®

Wirkstoff: Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff)

BADEZUSATZ

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Zusammensetzung

100 g Tannolact® enthalten 40 g Phenol-Methanal-Harnstoff-Polykondensat, sulfoniert, Natriumsalz (synthetischer Gerbstoff).

Sonstige Bestandteile: Calciumlactat-Pentahydrat, wasserfreies Natriumsulfat.

Darreichungsform und Menge

Tannolact® ist in folgenden Packungsgrößen erhältlich:

- Originalpackung mit 10 Portionsbeuteln à 10 g Badezusatz
- Originalpackung mit 40 Portionsbeuteln à 10 g Badezusatz
- Originaldose mit 150 g Badezusatz (mit Löffel)

Tannolact® wird, in Wasser aufgelöst, zur Bereitung von Umschlägen, Teil- und Vollbädern angewendet.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Tannolact® ist zur Anwendung auf der Haut bestimmt (Dermatikum).

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Galderma Laboratorium GmbH
Georg-Glock-Straße 8
D-40474 Düsseldorf
www.galderma.de

Anwendungsgebiete

Tannolact® wird bei Hauterkrankungen angewendet, die mit Entzündungen, Nässen und Juckreiz verbunden sind. Aufgrund der Darreichungsform ist Tannolact® besonders geeignet zur symptomatischen Behandlung von akuten, entzündlichen, nässenden und juckenden Hauterkrankungen an schwer zugänglichen Hautpartien (z.B. in den Körperfalten und im Anal- und Genitalbereich) und zur unterstützenden Behandlung bei Windeldermatitis und übermäßiger Schweißsekretion (Hyperhidrosis).

Gegenanzeigen

Wo bzw. wann dürfen Sie Tannolact® nicht anwenden?

Tannolact® dürfen Sie nicht am Auge anwenden. Wegen der Belastung des Kreislaufs dürfen Sie bei schwerer Herz- und Kreislauferkrankung, bei Bluthochdruck, fieberhaften Erkrankungen und Tuberkulose kein Vollbad nehmen.

In den seltenen Fällen einer Überempfindlichkeit (Hautreaktion) gegen einen der Inhaltsstoffe von Tannolact® sollten Sie das Präparat nicht weiter anwenden.

Wann dürfen Sie Tannolact® erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Bei größeren Hautverletzungen und akuten Hauterkrankungen sollten Sie vor der Anwendung von Tannolact® mit Ihrem Arzt sprechen.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Tannolact® können Sie auch während der Schwangerschaft und Stillzeit anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Tannolact® besitzt eine augenreizende Wirkung, so dass entsprechende Vorsichtsmaßnahmen empfohlen werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tannolact® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tannolact® sonst nicht richtig wirken kann!

Wie und wie oft sollten Sie Tannolact® anwenden?

Tannolact® gibt es in zwei verschiedenen Dosierungsformen:

1. Tannolact® in Portionsbeuteln mit jeweils 10 Gramm Inhalt, die eine problemlose Anwendung ermöglichen.
2. Tannolact® in der Dose (mit Löffel), die eine individuelle Dosierung mit dem innenliegenden Löffel erleichtert. Der Löffel faßt ca. 10 Gramm und eignet sich besonders zur Dosierung bei Teilbädern, feuchten Umschlägen, Waschungen und kalten Kompressen.

Zum Gebrauch wird die erforderliche Tannolact® Menge in kaltem oder warmem Wasser (32 °C – 35 °C) aufgelöst. Zur schnelleren Auflösung des Arzneimittels empfiehlt es sich, die benötigte Menge Tannolact® in den Strahl des einlaufenden Wassers zu geben und mit der Hand anschließend zu verteilen.

In Gegenwart von alkalischen Seifen wird die Wirksamkeit von Tannolact® beeinträchtigt, deshalb sollte während des Bades nicht gleichzeitig Seife benutzt werden.

Als Anhaltspunkt für die Bemessung der Wassermenge eignen sich die im Haushalt üblichen Plastikeimer, die in der Regel ca. 10 Liter fassen. Zur Durchführung von Sitzbädern sind in jedem guten Sanitätsfachgeschäft geeignete Schüsselsätze für die Toilette erhältlich.

Soweit nicht anders verordnet, ist Tannolact® wie folgt anzuwenden:

Vollbäder (bei Erwachsenen):

30 g Tannolact® auf ca. 150 l Wasser (= 3 Portionsbeutel oder 3 Löffel)

Vollbäder (bei Kindern):

5 g Tannolact® auf ca. 25 l Wasser (= ½ Portionsbeutel oder ½ Löffel)

Sitzbäder:

10 g Tannolact® auf ca. 25 l Wasser (= 1 Portionsbeutel oder 1 Löffel)

Teilbäder (Hand-, Arm-, Bein- oder Fußbäder):

5 g Tannolact® auf ca. 10 l Wasser (= ½ Portionsbeutel oder ½ Löffel)

Feuchte Umschläge, Waschungen und kalte Kompressen:

5 g Tannolact® auf ca. 5 l Wasser (= ½ Portionsbeutel oder ½ Löffel)

Bei hochakut entzündeter Haut, die bereits bei leichter Berührung mit Schmerzen und Brennen reagiert, wird eine Verringerung der Tannolact®-Konzentration empfohlen: 2,5 g Tannolact® auf ca. 5 l Wasser (= ¼ Portionsbeutel, entspricht einem gestrichenen Teelöffel oder ¼ Löffel).

Wie lange sollten Sie Tannolact® anwenden?

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem klinischen Bild der Hauterkrankung und beträgt im allgemeinen zwischen 3 und 14 Tagen. Bei länger bestehenden Erkrankungen kann Tannolact® auch zur längerfristigen Anwendung eingesetzt werden. Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Anwendungsfehler und Überdosierung

Nach versehentlicher Einnahme sollte zunächst Wasser getrunken werden. Anschließend ist der Arzt aufzusuchen, der über die weiteren Therapiemaßnahmen entscheidet.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Tannolact® auftreten?

Bei der lokalen Anwendung können in Einzelfällen leichte Hautreizungen auftreten. Der Wirkstoff oder die sonstigen Bestandteile von Tannolact® können selten zu einer Überempfindlichkeitsreaktion der Haut führen.

Tannolact® besitzt eine augenreizende Wirkung, so dass entsprechende Vorsichtsmaßnahmen empfohlen werden. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Bei Augenkontakt mit Tannolact®, vor allem unverdünnt, sollten Sie die Augen sofort für die Dauer von ca. 10 Minuten unter fließendem Wasser spülen und anschließend einen Arzt konsultieren.


Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit

Das Verfalldatum ist auf der Dose bzw. dem Portionsbeutel und der Faltschachtel angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Achten Sie stets darauf, dass Sie Arzneimittel so aufbewahren, dass sie für Kinder nicht zu erreichen sind.

Stand der Information: August 2004

Vollbäder bei Erwachsenen




Dosierung: für ca. 150 Liter Wasser
3 Portionsbeutel oder 3 Löffel
Temperatur: 32 °C – 35 °C
Badedauer: 10 – 15 Minuten
Häufigkeit der Anwendung: 2 – 3mal wöchentlich bis 1mal täglich


Dosierung: für ca. 25 Liter Wasser
1 Portionsbeutel oder 1 Löffel
Temperatur: 32 °C – 35 °C
Badedauer: 10 – 15 Minuten
Häufigkeit der Anwendung: 2 – 3mal wöchentlich bis 1mal täglich

Teilbäder (Hand-, Arm-, Bein-, oder Fußbäder)

Für Teilbäder eignen sich Waschbecken, Duschwannen und ausreichend große Schüsseln. Spezielle Arm- und Fußbadewannen sind in den Fachgeschäften erhältlich.



Vollbäder bei Kindern




Dosierung: für ca. 25 Liter Wasser
½ Portionsbeutel oder ½ Löffel
Temperatur: 32 °C – 35 °C
Badedauer: 10 – 15 Minuten
Häufigkeit der Anwendung: 2 – 3mal wöchentlich bis 1mal täglich

Dosierung: für ca. 10 – 12 Liter Wasser
½ Portionsbeutel oder ½ Löffel
Temperatur: 32 °C – 35 °C
Badedauer: 10 – 15 Minuten
Häufigkeit der Anwendung: 2 – 3mal wöchentlich bis 1mal täglich

Feuchte Umschläge, kalte Kompressen, Waschungen

Feuchte Umschläge werden locker angelegt. Durch Verdunstung sollen sie kühlen. Deshalb dürfen sie nicht mit wasserdichtem Material abgedeckt werden. Ein- oder zweimaliges Nachfeuchten mit Tannolact® (gelöst in Wasser) ist möglich. Kalte Kompressen werden am besten tiefend naß aufgelegt.



Sitzbäder

Für Sitzbäder können Dusch- und Badewannen sowie von der Größe her geeignete Schüsseln benutzt werden. Geeignete Schüsselsätze sind in jedem guten Sanitätsfachgeschäft erhältlich. Sie können direkt in die Toilette eingesetzt werden.



Dosierung: für ca. 5 Liter Wasser
½ Portionsbeutel oder ½ Löffel
Anwendungsdauer: 10 – 15 Minuten
Häufigkeit der Anwendung: 2 – 3mal täglich

Weitere Darreichungsformen: Tannolact® Lotio, Tannolact® Puder, Tannolact® Creme, Tannolact® Fettcreme.

GALDERMA

GI/7036/a
Druckfreigabe im Oktober 2004