ie die Dose senkrecht, drücken Sie auf das ntil und sprühen Sie aus einer Entfernung von ca. leichmäßig eine ausreichende Salbenmenge idfläche sollte mit einem feinen weißen Salbenbelag sein) auf die Wundfläche auf.

ste können, soweit dies der Zustand der Wunde prsichtig mit warmer Seifenlösung entfernt werden.

#### *tungen*

## Vebenwirkungen können bei der Anwendung ulan® Spray N auftreten?

ällen können lokale Unverträglichkeits- und/oder findlichkeitsreaktionen wie z.B. Juckreiz, Nässen, ustrocknung, allergische Kontaktreaktionen

ragen von Mirfulan® Spray N auf stark entzündtpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Beim en auf frische Wunden kann durch das Treibmittel utan) ein vorübergehendes Brennen auftreten.

Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in kungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese 1 Arzt oder Apotheker mit.

## Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Nebenwirkungen auftreten, dann sollten Sie Mirfulan<sup>®</sup> Spray N nicht mehr anwenden und Ihren Arzt oder Apotheker aufsuchen.

# Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der äußeren Umhüllung und auf der Spraydose aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Mirfulan® Spray N aufzubewahren? Mirfulan® Spray N sollte nicht über 25°C aufbewahrt werden.

Arzneimittel! Für Kinder unzugänglich aufbewahren!

#### Stand der Information

Mai 2006

Versionscode: Z01

# Mirfulan® Spray N

Dosierung: Je nach Bedarf mehrmals täglich

aufsprühen.

Salbe

Patienteninformation
Bitte aufmerksam lesen!

Vitaminreiche Wund- und Heilsalbe



1

X119126.05-Z01

Mirfulan® Spray N bitte vor Gebrauch gut schütteln! Falls keine oder zu wenig Salbe austritt, ist möglicherweise der Sprühkopf verstopft. Der weiße Sprühkopf läßt sich einfach abziehen und kann im Bedarfsfall mit heißem Seifenwasser gereinigt und mit einer Nadel durchstoßen werden.

Nicht in die Augen sprühen!

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

## Wie beeinflußt Mirfulan® Spray N die Wirkung von anderen Arzneimitteln?

Mirfulan® Spray N darf nicht gleichzeitig mit anderen Externa (Mittel zur äußerlichen Anwendung, z.B. Salben, Lösungen, usw.) angewendet werden, da Mirfulan® Spray N die Wirkung dieser Externa einschränken bzw. abschwächen kann.

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

# Dosierungsanleitung und Art der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Mirfulan<sup>®</sup> Spray N nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Mirfulan<sup>®</sup> Spray N sonst nicht richtig wirken kann! Halten Sie die Dose senkrecht, drücken Sie auf das Sprühventil und sprühen Sie aus einer Entfernung von ca. 20 cm gleichmäßig eine ausreichende Salbenmenge (die Wundfläche sollte mit einem feinen weißen Salbenbelag bedeckt sein) auf die Wundfläche auf.

#### Hinweis:

Salbenreste können, soweit dies der Zustand der Wunde zuläßt, vorsichtig mit warmer Seifenlösung entfernt werden.

### Nebenwirkungen

7

## Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Mirfulan® Spray N auftreten?

In Einzelfällen können lokale Unverträglichkeits- und/oder Überempfindlichkeitsreaktionen wie z.B. Juckreiz, Nässen, Rötung, Austrocknung, allergische Kontaktreaktionen auftreten.

Nach Auftragen von Mirfulan® Spray N auf stark entzündliche Hautpartien kann ein leichtes Brennen auftreten. Beim Aufsprühen auf frische Wunden kann durch das Treibmittel (Propan/Butan) ein vorübergehendes Brennen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

## Welche Gegenmaßn ergreifen?

Wenn Nebenwirkung Spray N nicht mehr a aufsuchen.

#### Hinweise und Anga Arzneimittels

Das Verfallsdatum die Umhüllung und auf de Sie diese Packung nic

Wie ist Mirfulan® Sp Mirfulan® Spray N soll werden. Arzneimittel! Für Kinde

## Stand der Informati

Mai 2006

Versionscode: Z01

8

## Eigenschaften:

2

Mirfulan® Spray N ist eine geschmeidige Wund- und Heilsalbe, die sich leicht und schmerzlos auf die gereizten oder erkrankten Hautstellen auftragen läßt. Die Sprayform ermöglicht eine hygienisch einwandfreie und saubere Anwendung, auch bei schwer zugänglichen Hautregionen.

Dank der hautfreundlichen Salbengrundlage dringt Mirfulan® Spray N rasch in das Hautgewebe ein. Die sinnvoll aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffe gelangen in feinster Verteilung in das Wundgebiet und beschleunigen den Heilungsprozeß. Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### **GEBRAUCHSINFORMATION**

## Mirfulan® Spray N

#### Wirkstoffe:

Zinkoxid, Lebertran, α-Bisabolol

#### Zusammensetzung:

#### **Arzneilich wirksame Bestandteile:**

125 ml = 99 g Mirfulan Spray N enthalten 52 g Salbe und 47 g Treibgas (Propan/Butan).

100 g Salbe enthalten:

25 g Zinkoxid

10 g Lebertran (mit Vitamin A und D<sub>3</sub> angereichert)

0,05 g α-Bisabolol

#### Sonstige Bestandteile:

Parfümöl, Vaseline, Wollwachsalkoholsal Paraffin, BHT E 321, Ascorbylpalmitat E : E 330, Propan, Butan.

### **Darreichungsform und Inhalt**

Sprühdose mit 125 ml = 99 g

Wund- und Heilsalbe

#### Pharmazeutischer Unternehme

Merckle Recordati GmbH, Eberhard-Fin 89075 Ulm.

Telefon: (0731) 7047-0 Fax: (0731) 7047-298

#### Hersteller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3

## Anwendungsgebiete

Nichtinfizierte großflächige Wunden, F Verletzungen, Schürfwunden, Verbren 2. Grades, Sonnenbrand, Dermatitider

3

Z

fmerksam, t, was Sie bei sollen. oder

#### **Sonstige Bestandteile:**

Parfümöl, Vaseline, Wollwachsalkoholsalbe, dünnflüssiges Paraffin, BHT E 321, Ascorbylpalmitat E 304, Citronensäure E 330, Propan, Butan.

### **Darreichungsform und Inhalt**

Sprühdose mit 125 ml = 99 g

Wund- und Heilsalbe

### **Pharmazeutischer Unternehmer**

Merckle Recordati GmbH, Eberhard-Finckh-Str. 55, 89075 Ulm.

Telefon: (0731) 7047-0 Fax: (0731) 7047-298

#### Hersteller

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren

## Anwendungsgebiete

Nichtinfizierte großflächige Wunden, Hautwunden nach Verletzungen, Schürfwunden, Verbrennungen 1. und 2. Grades, Sonnenbrand, Dermatitiden, Ekzeme, Schrunden (Fissuren, Rhagaden), Wundsein bei Säuglingen (Windeldermatitis) und bettlägerigen Patienten (Dekubitus), Pflege von Amputationsstümpfen.

### Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Mirfulan® Spray N nicht anwenden? Mirfulan® Spray N darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen Wollwachsalkohole und/oder andere Bestandteile der Salbe.

## Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

## Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Vor Anwendung von Mirfulan® Spray N sollte darauf geachtet werden, daß die Wunde nicht infiziert ist. Tritt trotz der Behandlung mit Mirfulan® Spray N keine Besserung auf, so muß überprüft werden, ob zwischenzeitlich eine Infektion im Wundgebiet aufgetreten ist und eine entsprechende Behandlung dieser Infektion notwendig ist. Die Sprühdose ist mit einem neutralen Sicherheitstreibgas gefüllt und steht unter Druck. Sie muß daher vor Erwärmung über 50° C (z.B. Sonnenbestrahlung) geschützt werden. Die Sprühdose darf nicht gewaltsam geöffnet oder verbrannt werden. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Körper sprühen.

4

chert)