



Gebrauchsinformation

LYMPHDIARAL® DS

Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

10 g Salbe enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Conium Dil. D2 1,0 g, Colchicum e seminibus (HAB 1934) Dil. D4 [HAB, V. 4a, Ø mit Ethanol 62% (m/m)] 0,1 g, Mercurius bijodatus Trit. D5 0,01 g, Stibium sulfuratum nigrum Trit. D1 0,01 g, Calendula Ø 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser, emulgierender Cetylstearylalkohol (Typ A), Oleum Petrae, Ethanol 86 % (m/m), [(Z)-Octadec-9-en-1-yl]oleat

Darreichungsform und Inhalt:

Originalpackungen mit 40 g und 100 g.
Bündelpackung mit 5 x 100 g Salbe.

Stoff- oder Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel

Firma und Anschrift des pharmazeutischen Unternehmers und Herstellers:

PASCOE pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen bzw. Großempfängerpostleitzahl 35383 Giessen, Telefon (0641)7960-0, Telefax (0641)7960-109, e-mail: info@pascoe.de

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Bei während der Anwendung fort-dauernden Krankheitssymptomen bitte medizinischen Rat einholen.

Gegenanzeigen:

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? LYMPHDIARAL® DS nicht anwenden in der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Säuglingen und Kleinkindern.

Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise:

Bei unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt auf-gesucht werden. Bei mehr als 4 Wochen fortbestehenden (auch schmerzlosen) Lymphknotenschwellungen oder einer Größenzunah-me der Lymphknoten ist eine ärztliche Abklärung erforderlich. Cetylstearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B. Kon-taktdermatitis) hervorrufen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arznei-mittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebens-weise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst wer-den.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.





10627-DE-002

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: Soweit nicht anders verordnet, 1 - 3 mal täglich Aufbringen und Einreiben von 2 - 3 cm Salbenstrang zunächst im Lymphknoten- und Lymphabflussbereich (Hals, Leiste), dann im Bereich der Beschwerden.

Kinder zwischen dem 7. und 12. Lebensjahr erhalten nicht mehr als 2/3 der Erwachsenenendosis.

Dauer der Anwendung:

LYMPHDIARAL® DS soll ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche angewendet werden.

Nebenwirkungen:

Bei der Anwendung von LYMPHDIARAL® DS wurden juckende Hautausschläge beobachtet. In diesem Fall ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Nach Anwendung von LYMPHDIARAL® DS kann Speichelfluss auftreten. Das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweise: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise:

Nach Ablauf des auf Tube und Faltschachtel angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach Anbruch:

3 Monate.

Datum der Fassung:

11/2007



Weil ich die Wahl habe.

