

Stand der Information

Juni 2006

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Apothekenpflichtig

Eigenschaften

Die Nase erfüllt im gesunden Zustand die Funktion, die eingeatmete Luft aufzuwärmen, anzufeuchten und zu filtern, wodurch das Bronchialsystem vor der kalten Außenluft und vor Austrocknung geschützt wird. Zu diesem Zweck ist die Nase mit einer gut durchbluteten Schleimhaut ausgekleidet.

Eine zusätzliche Reinigungsfunktion haben die Flimmerhärchen im Nasen-Rachen-Raum, deren Aktivität bei unzureichender Befeuchtung und entzündlicher Veränderung der Schleimhaut jedoch stark eingeschränkt wird.

Um den entzündlichen Veränderungen sowie den Austrocknungsercheinungen bei Fehlfunktion der Nasenschleimhaut entgegenzuwirken, wird nasic[®]-cur mit dem Wirkstoff Dexpanthenol mit Hilfe der Sprühvorrichtung lokal an der Nasenschleimhaut eingesetzt.

nasic[®]-cur enthält den Wirkstoff Dexpanthenol, eine Abwandlung des Vitamins Pantothersäure. Dieses Vitamin, das auch mit der täglichen Nahrung aufgenommen wird, wird für alle Gewebe des menschlichen Organismus benötigt. Dexpanthenol, das ebenfalls Vitamin-Aktivität besitzt, zeichnet sich durch wundheilungsfördernde und schleimhautschützende Wirkeigenschaften aus.

16

01P0506

32 005 341



cassella
med



cassella
med

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

nasic[®]-cur
Nasenspray
Dexpanthenol 5%

Wirkstoff: Dexpanthenol

Nasenspray mit Sprühvorrichtung

Zusammensetzung

10 g nasic[®]-cur enthalten:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: 500 mg Dexpanthenol

Sonstige Bestandteile:

Benzalkoniumchlorid 2 mg, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Kaliumdihydrogenphosphat, Natriumchlorid, Gereinigtes Wasser.

1 Sprühstoß zu 0,1 ml enthält 5 mg Dexpanthenol.

10 g entsprechen 9,9 ml Lösung.

Darreichungsform und Inhalt

Nasenspray, Lösung

nasic[®]-cur ist eine wässrige Lösung, die in einer Flasche zu 20 ml (N2) erhältlich ist.

Der in nasic[®]-cur enthaltene Wirkstoff Dexpanthenol ist ein Abkömmling des Vitamins Pantothersäure, das sich durch wundheilungsfördernde und schleimhautschützende Eigenschaften auszeichnet.

Pharmazeutischer Unternehmer

Cassella-med
Gereonsmühlengasse 1
50670 Köln

Tel.: 02 21/12 01 57

Fax: 02 21/1 65 25 13

E-Mail: cmed@Cassella-med.de

(Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Cassella-med)



Artesan Pharma
Wendlandstr. 1
29439 Lüchow
Tel.: 0 58 41/9 39 - 0
Fax: 0 58 41/9 39 - 200

Hersteller

Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41
12277 Berlin
Tel.: 0 30/72 00 70
Fax: 0 30/72 00 72 34

Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung der Heilung von Schädigungen (Läsionen) bei trockener Nasenschleimhaut.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie nasic[®]-cur nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe von nasic[®]-cur darf dieses Arzneimittel nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es sind keine Anwendungsbeschränkungen zu beachten.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?

Es sind keine besonderen Maßnahmen zu beachten.

Wechselwirkungen

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von nasic[®]-cur?

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.




Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt nasic[®]-cur nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da nasic[®]-cur sonst nicht richtig wirken kann!

Wie viel von nasic[®]-cur und wie oft sollten Sie nasic[®]-cur anwenden?

Erwachsene und Kinder geben drei- bis viermal täglich 1 – 2 Sprühstöße (5 – 10 mg Dexpanthenol) bei senkrecht gehaltener Flasche in jedes Nasenloch; während des Sprühvorgangs wird durch die Nase eingeatmet.

Wie und wann sollten Sie nasic[®]-cur anwenden?



Nasale Anwendung:

Die längere Schutzkappe abziehen. Den Verschluss von der Glasflasche abdrehen und den Sprühkopf aufschrauben.

Dann die Schutzkappe für den Sprühkopf abziehen. Vor der ersten Anwendung mehrmals pumpen, bis ein gleichmäßiger Sprühnebel austritt.



Den Sprühkopf möglichst senkrecht in die Nasenöffnung einführen und jeweils 1 – 2 mal pumpen. Dabei leicht durch die Nase einatmen. Nach Gebrauch den Sprühkopf aus hygienischen Gründen abwischen und die Schutzkappe wieder aufsetzen. Bei allen weiteren Anwendungen ist das Dosierspray sofort gebrauchsfertig.

Die Anwendung kann unabhängig von der Tageszeit erfolgen.

Wie lange sollten Sie nasic[®]-cur anwenden?

nasic[®]-cur soll nicht länger als vier Wochen angewendet werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von nasic[®]-cur auftreten?

In Einzelfällen können Unverträglichkeitsreaktionen auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Falls Nebenwirkungen auftreten, das Arzneimittel bitte nicht weiterverwenden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Haltbarkeit nach Öffnen der Flasche beträgt 6 Monate.

