



Gebrauchsinformation

Visine® Yxin® ED

Augentropfen

Wirkstoff: Tetryzolinhydrochlorid

5R9281
84008 PB 181/4-JJ



Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 ml Augentropfen enthält 0,5 mg Tetryzolinhydrochlorid.

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Borsäure, Natriumtetraborat, Wasser für Injektionszwecke.

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 10 Visine Yxin ED (Einzeldosisbehälter) à 0,5 ml Augentropfen.

Packung mit 20 Visine Yxin ED (Einzeldosisbehälter) à 0,5 ml Augentropfen.

Stoff- oder Indikationsgruppe

Ophthalmikum

Sympathomimetikum

Pharmazeutischer Unternehmer

PFIZER Consumer Healthcare GmbH

Priferstraße 1

76139 Karlsruhe

Tel.: 0721/6101-04

Fax: 0721/6203-04

Hersteller

Pharmapiast Vertriebs GmbH

Postfach 20 04 56

13514 Berlin

Anwendungsgebiete

Zur Schleimhautabschwellung bei Augenreizungen, z. B. durch Rauch, Wind, gechlortes Wasser und Licht und bei allergischen Entzündungen, wie z. B. Heufieber und Blütenstaubüberempfindlichkeit.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Visine Yxin ED nicht anwenden?

Visine Yxin ED Augentropfen sollen nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegenüber den Inhaltsstoffen, grünem Star (Engwinkelglaukom) sowie bei Kindern unter 2 Jahren.

Wann darf Visine Yxin ED nur unter bestimmten Bedingungen angewendet werden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Visine Yxin ED nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Sie sollten Visine Yxin ED nur auf Anraten des Arztes anwenden, wenn Sie an einer schweren Herz-Kreislauf-Erkrankung (z. B. koronare Herzkrankheit, Bluthochdruck, Phäochromozytom), an Stoffwechselstörungen (z. B. Schilddrüsenüberfunktion, Zuckerkrankheit) und an trockener Nasenschleimhaut- und Bindehautentzündung leiden sowie bei Behandlung mit möglicherweise blutdrucksteigernden Medikamenten (z. B. MAO-Hemmer).

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Visine Yxin ED darf in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Säuglinge und Kinder unter 2 Jahren dürfen nicht mit Visine Yxin ED behandelt werden. Langfristige Anwendung und Überdosierung, vor allem bei Kindern, sind zu vermeiden. Die Anwendung bei Kindern und bei höheren Dosierungen darf daher nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Augenreizungen oder Augenrötungen sind häufig ein Zeichen für ernste Augenerkrankungen, die durch den Augenarzt behandelt werden müssen. Der Augenarzt sollte sofort aufgesucht werden, wenn starke akute oder einseitige Augenrötung auftritt oder starke Augen- und Kopfschmerzen, Sehverschlechterung, Sehen von Doppelbildern oder fliegende Punkte vor den Augen auftreten.

Kontaktlinsen dürfen bei der vorliegenden Augenerkrankung nicht getragen werden. Wenn in Ausnahmefällen das Tragen von harten Kontaktlinsen vom Augenarzt gestattet ist, werden diese vor dem Eintropfen herausgenommen und erst 15 Minuten nach dem Eintropfen wieder eingesetzt.

Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen beachten?

Nach Anwendung von Visine Yxin ED Augentropfen kann es in seltenen Fällen zu einer Pupillenerweiterung und verschwommenem Sehen kommen. In diesen Fällen kann das Reaktionsvermögen im Straßenverkehr oder das Bedienen von Maschinen beeinträchtigt sein.

Daher sollten Sie im Zweifel Ihren Arzt fragen, bevor Sie Auto oder andere Fahrzeuge fahren oder elektrische Werkzeuge oder Maschinen bedienen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Was müssen Sie beachten, wenn zusätzlich andere Arzneimittel eingenommen oder angewendet werden?

Bei gleichzeitiger Anwendung von MAO-Hemmern und trizyklischen Antidepressiva kann durch Verstärkung der gefäßverengenden Wirkung eine Blutdruckerhöhung auftreten.



Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Visine Yxin ED nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an diese Anwendungsvorschriften, da Visine Yxin ED sonst nicht richtig wirken kann!


Visine Yxin ED ist zur Anwendung am Auge bestimmt.

Wie viel und wie oft sollten Sie Visine Yxin ED anwenden?

2- bis 3-mal täglich wird 1 Tropfen in den Bindehautsack eingeträufelt. Kontaktlinsen vorher entfernen (siehe Vorsichtsmaßnahmen). Die Füllmenge der Visine Yxin ED (Einzeldosisbehältnis) ist so abgestimmt, dass sie für eine einmalige Anwendung für beide Augen ausreicht.

Wie sollten Sie Visine Yxin ED anwenden?

Nachdem eine Visine Yxin ED vom Streifen abgetrennt ist (s. Abb. 1), wird der obere, flache und ungefüllte Teil abgedreht (s. Abb. 2) und die Tropfen durch leichten Druck auf den gefüllten Teil in den Bindehautsack des Auges eingeträufelt (s. Abb. 3). Die Visine Yxin ED gewährleistet Sterilität und Unversehrtheit für jede Einzelgabe der Augentropfen.



Wie lange sollten Sie Visine Yxin ED anwenden?

Visine Yxin ED sollte nur bei leichteren Reizzuständen des Auges verwendet werden. Tritt binnen 48 Stunden keine Besserung ein, oder wenn die Augenreizung oder Rötung bestehen bleibt oder zunimmt, sollten Sie Visine Yxin ED nicht weiter verwenden und einen Arzt aufsuchen.

Langfristige Anwendung und Überdosierung, vor allem bei Kindern, sind zu vermeiden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Visine Yxin ED in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Verständigen Sie sofort einen Arzt.

Eine Überdosierung und langfristige Anwendung sollte, besonders bei Kindern, vermieden werden. Bei diesen kann es, z. B. auch durch Verschlucken, zu Überdosierungserscheinungen mit Blutdruckanstieg und Herzrhythmusstörungen kommen.

Weitere Symptome einer erheblichen Überdosierung können sein: Pupillenerweiterung, Übelkeit, Cyanose, Fieber, Krämpfe, schneller Herzschlag, Herzrhythmusstörungen, Herzstillstand, Lungenödem, Atemstörungen, psychische Störungen.

Außerdem unter Umständen Zeichen für eine Störung der Hirnfunktion wie Schläfrigkeit, Erniedrigung der Körpertemperatur, verlangsamer Herzschlag, schockähnlicher Blutdruckabfall, Atemstillstand und Koma.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Visine Yxin ED auftreten?

Gelegentlich kann es zu vermehrter Durchblutung (reaktiver Hyperämie), Schleimhautbrennen, Schleimhauttrockenheit sowie zu allgemeinen Wirkungen (z. B. Herzklopfen, Kopfschmerzen, Zittern, Schwäche, Schwitzen und Blutdruckanstieg) kommen.

In einem Einzelfall wurde nach langfristiger Anwendung von Tetryzolin über eine Austrocknung der Bindehaut mit Verschluss der Tränenpunktkanäle und Tränenträufeln berichtet.

Bei Visine Yxin ED Augentropfen kann ein verschwommenes Sehen, eine Bindehautreizung oder in seltenen Fällen eine Mydriasis auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Die Nebenwirkungen von Visine Yxin ED sind im Allgemeinen nur leichter Natur, so dass eine Beendigung der Behandlung nicht notwendig ist. Bei stärkeren Beeinträchtigungen sollten Sie Ihren Arzt benachrichtigen, der über die weitere Anwendung oder gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheidet.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf der Verpackung angegeben. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Einzeldosisbehältnisse sind jeweils nur für eine Anwendung bestimmt. Die Augentropfen sind sofort nach Anbruch zu verwenden. Die nach der Anwendung in den Einzeldosisbehältnissen verbleibende Restmenge muss verworfen werden.

Wie ist Visine Yxin ED aufzubewahren?

Visine Yxin ED (Einzeldosisbehältnis) nicht über 25° C lagern!

Stand der Information

September 2005

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Eigenschaften

Visine Yxin ED wirkt gefäßverengend und sekretionsmindernd. Die Wirkung tritt wenige Minuten nach Einträufelung in den Bindehautsack ein und hält längere Zeit an.

pal-5v4-1010vye-at-05