

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

### Silymarin-CT Hartkapseln



Wirkstoff:  
Mariendistelfrüchte-Trockenextrakt, entsprechend 117 mg Silymarin.

#### Zusammensetzung

- *arzneilich wirksame Bestandteile:*  
1 Hartkapsel enthält 194,45–218,75 mg Trockenextrakt aus Mariendistelfrüchten (20–50 : 1), entsprechend 117 mg Silymarin (berechnet als Silibinin, HPLC nach DAB 2001); Auszugsmittel: Ethanol 96 % (V/V).
- *sonstige Bestandteile:*  
Magnesiumstearat (Ph.Eur.), Gelatine, Titandioxid, Eisen(III)-oxid.

#### Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 30 oder 100 Hartkapseln.

#### Stoff- und Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Pflanzliches Arzneimittel bei Lebererkrankungen

#### CT-Arzneimittel GmbH

Lengeder Str. 42a, 13407 Berlin  
Telefon: 0 30/40 90 08-0, Telefax: 0 30/40 90 08-21  
www.ct-arzneimittel.de

#### Anwendungsgebiete

Zur unterstützenden Behandlung bei chronisch-entzündlichen Lebererkrankungen, Leberzirrhose und toxischen Leberschäden.

Diese Arzneimitteltherapie ersetzt nicht die Vermeidung der die Leber schädigenden Ursachen (z. B. Alkohol). Bei Gelbsucht (hell- bis dunkelgelbe Hautverfärbung, Gelbfärbung des Augenweiß) sollte ein Arzt aufgesucht werden.

#### Hinweis:

Dieses Arzneimittel ist nicht zur Behandlung von akuten Vergiftungen geeignet.

#### Gegenanzeigen

##### Wann dürfen Sie Silymarin-CT nicht einnehmen?

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Zubereitungen aus Mariendistelfrüchten und/oder anderen Korbblütlern oder einem der sonstigen Bestandteile.

##### Was muss in Schwangerschaft und Stillzeit beachtet werden?

Silymarin-CT darf in der Schwangerschaft nicht eingenommen werden.  
Silymarin-CT soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in der Stillzeit nicht eingenommen werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

Zur Anwendung von Silymarin-CT bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Bisher keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Silymarin-CT nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Silymarin-CT sonst nicht richtig wirken können.

#### **Wie viel und wie oft sollten Sie Silymarin-CT einnehmen?**

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahren 2–3-mal täglich je 1 Hartkapsel ein.

#### **Wie sollten Sie Silymarin-CT einnehmen?**

Silymarin-CT werden unzerkaut mit etwas Flüssigkeit eingenommen.

#### **Wie lange sollten Sie Silymarin-CT einnehmen?**

Die Dauer der Anwendung bestimmt der Arzt.

### **Anwendungsfehler und Überdosierung**

#### **Was ist zu tun, wenn Silymarin-CT in zu großen Mengen eingenommen wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?**

Vergiftungserscheinungen sind bisher noch nicht beobachtet worden.

Bei Überdosierung kann die beschriebene Nebenwirkung in verstärktem Maße auftreten. In diesem Fall ist der Arzt zu informieren.

### **Nebenwirkungen**

#### **Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Silymarin-CT auftreten?**

Vereinzelt wird eine leicht abführende (laxierende) Wirkung beobachtet.

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen, z. B. Hautausschlag oder Atemnot auftreten.

#### **Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?**

Sollten Sie eine der oben genannten Nebenwirkungen bei sich beobachten, so informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen entscheiden kann.

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf Silymarin-CT nicht nochmals eingenommen werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel und den Durchdrückpackungen aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

### **Stand der Information**

Mai 2005

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

**CT-Arzneimittel wünscht Ihnen gute Besserung!**

Versionscode: Z05

**CT**  
Arzneimittel

X101891.04-Z05