

Dermapharm AG

Gebrauchsinformation:
Information für den Anwender

Rivanol® Lösung 0,1 %

Wirkstoff: Ethacridinlactat-Monohydrat

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Rivanol® Lösung 0,1 % jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Rivanol® Lösung 0,1 % und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Rivanol® Lösung 0,1 % beachten?
3. Wie ist Rivanol® Lösung 0,1 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Rivanol® Lösung 0,1 % aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Rivanol® Lösung 0,1 % und wofür wird sie angewendet?

Rivanol® Lösung 0,1 % ist ein Desinfizienz/Antiseptikum.

Rivanol® Lösung 0,1 % wird lokal angewendet als Antiseptikum.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Rivanol® Lösung 0,1 % beachten?

Rivanol® Lösung 0,1 % darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Ethacridinlactat und andere Acridinderivate sind.

Rivanol® Lösung 0,1 % darf nicht im Augenbereich angewendet werden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Rivanol® Lösung 0,1 % ist erforderlich:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Bei Anwendung von Rivanol® Lösung 0,1 % mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Rivanol® Lösung 0,1 % nicht mit

anderen Lösungen mischen, da es sonst zu Ausflockungen kommen kann.

Schwangerschaft und Stillzeit

Durch Versuche mit Ethacridinlactat an Tieren konnte eine Entstehung von Mißbildungen nicht nachgewiesen werden.

Erfahrungen über die Sicherheit beim Menschen mit der Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit liegen nicht vor. Es ist nicht bekannt, ob Ethacridinlactat-Monohydrat in die Muttermilch übergeht. Rivanol® Lösung 0,1 % soll deshalb in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist Rivanol® Lösung 0,1 % anzuwenden?

Wenden Sie Rivanol® Lösung 0,1 % immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die übliche Dosis ist:
2mal täglich unverdünnte Rivanol®
Lösung 0,1 % örtlich für wenigstens
30 Minuten einwirken lassen.

Art der Anwendung
Zur Anwendung auf der Haut

Dauer der Anwendung
Wenden Sie Rivanol® Lösung 0,1
% ohne ärztlichen Rat nicht länger als
7 Tage an.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder
Apotheker, wenn Sie den Eindruck
haben, dass die Wirkung von
Rivanol® Lösung 0,1 % zu stark
oder zu schwach ist.

**Wenn Sie eine größere Menge von
Rivanol® Lösung 0,1 % ange-
wendet haben, als Sie sollten:**
Sie können die Behandlung mit der
angegebenen Dosierung fortsetzen.
Bei einer kurzfristigen Überdosierung
sind keine Beeinträchtigungen zu
erwarten.

**Wenn Sie die Anwendung von
Rivanol® Lösung 0,1 % verges-
sen haben:**
Wenden Sie nicht die doppelte Dosis
an, wenn Sie die vorherige Anwen-
dung vergessen haben.

**Wenn Sie die Anwendung von
Rivanol® Lösung 0,1 % ab-
brechen:**
Sie könnten den Behandlungserfolg
gefährden. Bitte sprechen Sie mit
Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie
die Behandlung mit Rivanol® Lö-
sung 0,1 % abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur
Anwendung des Arzneimittels haben,
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind
möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Rivanol®
Lösung 0,1 % Nebenwirkungen
haben, die aber nicht bei jedem Be-
handelten auftreten müssen. Bei der
Bewertung von Nebenwirkungen wer-
den folgende Häufigkeitsangaben zu-
grunde gelegt:

Sehr häufig	mehr als 1 Be- handelter von 10
Häufig	1 bis 10 Be- handelte von 100
Gelegentlich	1 bis 10 Be- handelte von 1.000
Selten	1 bis 10 Be- handelte von 10.000
Sehr selten	weniger als 1 Behandelter von 10.000
Nicht bekannt	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht ab- schätzbar.

Mögliche Nebenwirkungen
Gelegentlich kommt es zu Entzün-
dungsreaktionen der Haut. Selten ist
das Auftreten von Schwellungen im
Gesicht, Nesselsucht (Urtikaria), Kopf-
schmerzen und Krämpfen bekannt ge-
worden.

Wenn eine der aufgeführten Neben-
wirkungen Sie erheblich beeinträch-
tigt oder Sie Nebenwirkungen bemer-
ken, die nicht in dieser Gebrauchsinfor-
mation angegeben sind, informieren
Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**5. Wie ist Rivanol® Lösung 0,1 %
aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich
aufbewahren!
Vor Licht geschützt lagern.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem
auf der Packung nach verwendbar bis
angegebenen Verfalldatum nicht mehr
verwenden. Das Verfalldatum bezieht
sich auf den letzten Tag des Monats.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach
Anbruch**

Nach Anbruch der Flasche ist
Rivanol® Lösung 0,1 %
14 Tage haltbar.

6. Weitere Informationen

**Was Rivanol® Lösung 0,1 %
enthält:**

Der Wirkstoff ist Ethacridinlactat-
Monohydrat.
1 ml Lösung enthält 1,05 mg Ethacridin-
lactat-Monohydrat.

Der sonstige Bestandteil ist gereinigtes
Wasser.

**Wie Rivanol® Lösung 0,1 % aus-
sieht und Inhalt der Packung:**
Rivanol® Lösung 0,1 % ist eine
gelbe Lösung und ist in Flaschen zu
100 ml/N1, 300 ml/N2, 500 ml/N3,
1000 ml/N3 und 6 x 500 ml Lösung
erhältlich.

**Pharmazeutischer
Unternehmer:**

Dermapharm AG
Luise-Ulrich-Straße 6
82031 Grünwald
Tel.: 089/64186-0
Fax: 089/64186-130

Hersteller:

mibe GmbH Arzneimittel
Münchener Straße 15
06796 Brehna
(ein Tochterunternehmen
der Dermapharm AG)

**Diese Gebrauchsinformation wurde
zuletzt überarbeitet im Oktober
2007.**

Recyclingpapier - spart Energie und
Rohstoffe. Ein aktiver Beitrag zum
Umweltschutz.



07/08

GI00686-01
Code 690