

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Clabin[®] N

Lösung zur Anwendung auf der Haut
Wirkstoffe: Salicylsäure, Milchsäure

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Clabin[®]N jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 1 Woche keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Clabin[®]N und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Clabin[®]N beachten?
3. Wie ist Clabin[®]N anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Clabin[®]N aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Clabin[®]N und wofür wird es angewendet?

Clabin[®]N ist ein Arzneimittel zur äußerlichen Behandlung von Hühneraugen, vulgären Warzen und Kallus (Schwielen).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Clabin[®]N beachten?

Clabin[®]N darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen Salicylsäure oder Milchsäure sowie Salicylaten oder einem der sonstigen Bestandteile von Clabin[®]N sind,
- bei Säuglingen oder
- bei Patienten mit Niereninsuffizienz.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Clabin[®]N ist erforderlich:

Clabin[®]N sollte nicht im Gesicht oder Genitalbereich angewendet werden. Im Zweifelsfall ist der Arzt aufzusuchen. Nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung bringen!

Warzen sind übertragbar! Um eine Infektionsausbreitung zu verhindern, sollte das eigene Handtuch nie zur Mitbenutzung an Andere weitergegeben werden.

Bei Vorhandensein von Fußwarzen nicht barfuß gehen!

Bei Anwendung von Clabin[®]N mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer lokal angewendeter Arzneimittel durch die Haut verstärken. Die aufgenommene Salicylsäure verzögert den Abbau von Methotrexat und verstärkt die Wirkung von Sulfonylharnstoffen.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Clabin[®]N darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm²) angewendet werden.

Clabin[®]N darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von Clabin[®]N durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden. Sollte der Arzt eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit Clabin[®]N für notwendig halten, so ist frühzeitig abzustillen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

3. Wie ist Clabin®N anzuwenden?

Wenden Sie Clabin®N immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Clabin®N ist zur Anwendung auf der Haut bestimmt.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Clabin®N 1- bis 3-mal täglich auf die zu behandelnden Hautstellen auftragen.

Möglichst dabei die umliegende gesunde Haut nicht benetzen. Die behandelten Hautstellen trocknen lassen.

Nach 3 - 4 Tagen die gelockerte Haut, gegebenenfalls nach heißem Seifenbad, entfernen.

Die maximale tägliche Dosis für Erwachsene von 2 g darf nicht länger als 1 Woche angewendet werden. Für Kinder darf die Tagesdosis von 0,2 g nicht überschritten werden.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Clabin®N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zu Grunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Clabin®N kann selten lokale Hautreizungen hervorrufen. In Einzelfällen kann es zu Kontaktallergien kommen.

Im Falle übermäßiger Reizung sollte die Behandlung zwischenzeitlich unterbrochen und nach Abklingen der Reaktion wieder aufgenommen werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Clabin®N aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Flasche und der Faltschachtel angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Vorsicht, leicht entflammbar! Von offenem Feuer fernhalten.

Verschließen Sie nach Anwendung Clabin®N gut und stellen Sie sicher, dass sich keine Lösung mehr am Flaschenhals befindet. So verhindern Sie ein Auskristallisieren von Clabin®N und ein Verkleben der Öffnung.

6. Weitere Informationen

1 g Clabin®N Lösung enthält:

Wirkstoffe:

Milchsäure (Ph.Eur.) 46 mg

Salicylsäure (Ph.Eur.) 140 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Elastisches Collodium S (enthält Ether, Natives Rizinusöl, Terpentinöl, Ethylacetat und Pyroxylin (mit 35 % 2-Propanol (Ph. Eur.)),

Clabin®N ist in Packungen mit 8 g Lösung erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

Deutsche Chefaro Pharma GmbH
45725 Waltrop
Tel.: 02309 / 640
Fax: 02309 / 64 424

Hersteller:

Pharbil Waltrop GmbH
Postfach 390 · 45724 Waltrop
Tel.: 02309 / 93750
Fax: 02309 / 937 53 92