

Gebrauchsinformation

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihr Krankheitsbild verschlimmert oder nach 4–5 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie einen Arzt aufsuchen.

1. Was ist NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser beachten?
3. Wie ist NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser aufzubewahren?

NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser

Wirkstoff: Acetylcystein

Der arzneilich wirksame Bestandteil ist Acetylcystein.

1 Brausetablette enthält 600 mg Acetylcystein.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Wasserfreie Citronensäure (Ph.Eur.), Natriumhydrogencarbonat, Citronenaroma, Adipinsäure, Povidon K25, Aspartam.

NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser ist in Packungen mit 10 und 20 Brausetabletten erhältlich.

1. WAS IST NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser ist ein Arzneimittel zur Verflüssigung von zähem Schleim in den Atemwegen.

von:

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm
Telefon: (07 31) 4 02 02, Telefax: (07 31) 4 02 73 30
www.ratiopharm.de

hergestellt von:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren
Telefon: (0 73 44) 1 40, Telefax: (0 73 44) 14 16 20
www.merckle.de

NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser wird zur Schleimlösung und zum erleichterten Abhusten bei Atemwegserkrankungen mit zähem Schleim angewendet.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser BEACHTEN?

Sie dürfen NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich gegenüber Acetylcystein oder einem der sonstigen Bestandteile von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser sind.

Kinder

NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Hierfür stehen Arzneimittel mit einem geringeren Wirkstoffgehalt zur Verfügung.

Schwangerschaft und Stillzeit

Über eine Anwendung von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser in Schwangerschaft und Stillzeit liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Sie dürfen NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser in der Schwangerschaft und Stillzeit nur anwenden, wenn Ihr Arzt entschieden hat, dass die Anwendung absolut notwendig ist.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte Bestandteile von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser

NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser enthält 20 mg Aspartam als Quelle für Phenylalanin (entsprechend 11,2 mg/Brausetablette) und kann schädlich sein, wenn Sie eine Phenylketonurie haben.

Eine Brausetablette enthält 6,5 mmol (150,2 mg) Natrium. Wenn Sie eine kochsalzarme Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hustenstillende Arzneimittel

Bei kombinierter Anwendung von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser und hustenstillenden Arzneimitteln kann der verflüssigte Schleim eventuell nicht mehr ausreichend abgehustet werden. Fragen Sie daher vor einer kombinierten Anwendung unbedingt Ihren Arzt.

Arzneimittel mit dem Wirkstoff Tetracyclinhydrochlorid (Antibiotikum)

Eine Wirkungsabschwächung von Tetracyclinhydrochlorid bei zeitgleicher Einnahme mit NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser ist möglich. Die Einnahme beider Arzneimittel muss daher zeitversetzt, in einem mindestens 2-stündigen Abstand erfolgen.

Arzneimittel mit dem Wirkstoff Glyceroltrinitrat (Herzmittel)

Die gleichzeitige Gabe von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser kann zu einer Verstärkung des gefäß-erweiternden und blutverdünnenden Effekts von Medikamenten mit dem Wirkstoff Glyceroltrinitrat führen.

Inkompatibilitäten (physikalische Unverträglichkeit)

Berichte über eine Inaktivierung von Antibiotika durch Acetylcystein oder andere Mukolytika betreffen bisher ausschließlich In-vitro-Versuche, bei denen die betreffenden Substanzen direkt gemischt wurden. Dennoch soll aus Sicherheitsgründen die orale Applikation von Antibiotika getrennt und in einem mindestens 2-stündigen Abstand zeitversetzt erfolgen. In-vitro-Inkompatibilitäten sind vor allem für halbsynthetische Penicilline, Tetracycline, Cephalosporine sowie Aminoglycoside beschrieben worden. Über Antibiotika wie Amoxicillin, Doxycyclin, Erythromycin oder Thiamphenicol sowie Cefuroxim wurden hierbei keine Inkompatibilitäten berichtet.

3. WIE IST NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser ANZUWENDEN?

Wenden Sie NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Nehmen Sie NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser nach den Mahlzeiten ein.

Lösen Sie bitte die Brausetablette in einem Glas Trinkwasser auf und trinken Sie den Inhalt des Glases vollständig aus.

Hinweis:

Die schleimlösende Wirkung von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser wird durch zusätzliche Flüssigkeitszufuhr verbessert.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Alter	Tagesgesamtdosis
Jugendliche über 14 Jahre und Erwachsene	2-mal täglich je ½ Brausetablette oder 1-mal täglich je 1 Brausetablette

Sollten sich die Symptome verschlimmern oder nach 4 – 5 Tagen Behandlung nicht bessern, sollten Sie Ihren Arzt befragen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser angewendet haben, als Sie sollten...

Bei Überdosierung können Reizerscheinungen im Magen-Darm-Bereich auftreten. Diese können sich als Sodbrennen, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall äußern.

Schwerwiegende Nebenwirkungen oder Vergiftungserscheinungen sind jedoch auch bei extremer Überdosierung bisher nicht beobachtet worden. Bei Verdacht auf eine Überdosierung mit NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser benachrichtigen Sie bitte dennoch Ihren Arzt.

Wenn Sie die Anwendung von NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser vergessen haben:

Wenn Sie einmal vergessen haben, NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser einzunehmen oder zu wenig eingenommen haben, holen Sie die vergessene Einnahme nicht nach, sondern setzen Sie bitte beim nächsten Mal die Dosierung wie beschrieben fort.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 von 10 Behandelten	Häufig: mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: mehr als 1 von 1000 Behandelten	Selten: mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle	

Nebenwirkungen

Gelegentlich: Mundschleimhautentzündungen, Kopfschmerzen, Ohrgeräusche.

Selten: Beschwerden im Magen-Darm-Bereich (z. B. Sodbrennen, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall), Blutungen, zum Teil im Rahmen von Überempfindlichkeitsreaktionen.

Sehr selten: Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Juckreiz, Quaddelbildung, Hautausschlag, Atemnot (überwiegend bei Asthmatikern), Herzschlagsbeschleunigung, Blutdrucksenkung), Bronchospasmen (Krämpfe im Bereich der Atemwegsorgane) überwiegend bei Patienten mit hyperreaktivem Bronchialsystem bei Asthma bronchiale (eine übersteigerte Reaktion in den Atemorganen bei einer besonderen Atemwegserkrankung).

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

Gegenmaßnahmen

Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion darf NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser nicht nochmals eingenommen werden. Informieren Sie Ihren Arzt, damit er über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

5. WIE IST NAC-ratiopharm® akut 600 Hustenlöser AUFZUBEWAHREN?

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Das Verfallsdatum dieser Packung finden Sie auf der Faltschachtel und der Tablettenröhre.

Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nicht über 25 °C lagern!

Die Tablettenröhre nach Gebrauch fest verschließen, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen!

Stand der Information

März 2003

Versionscode: Z03