


## GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

# ANGOCIN® *Anti-Infekt N*

Filmtabletten

Wirkstoffe: Kapuzinerkressenkrautpulver und Meerrettichwurzelpulver



**Bitte lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss ANGOCIN® *Anti-Infekt N* jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist ANGOCIN® *Anti-Infekt N* und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* beachten?
3. Wie ist ANGOCIN® *Anti-Infekt N* einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist ANGOCIN® *Anti-Infekt N* aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS IST ANGOCIN® ANTI-INFEKT N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

#### Stoffgruppe:

ANGOCIN® *Anti-Infekt N* ist ein pflanzliches Arzneimittel zur Infektabwehr. Die Wirkstoffe sind:

- Kapuzinerkressenkrautpulver
- Meerrettichwurzelpulver

#### Anwendungsgebiete:

ANGOCIN® *Anti-Infekt N* wird angewendet:

- bei Infektionen der Harnwege
- bei entzündlichen Erkrankungen der Gaumenmandeln, der Nase und der Nasennebenhöhlen
- bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege
- bei grippalen Infekten

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON ANGOCIN® ANTI-INFEKT N BEACHTEN?

ANGOCIN® *Anti-Infekt N* darf **nicht** eingenommen werden:

- wenn Sie unter akuten Magen- und Darmgeschwüren und/oder akuten Nierenentzündungen leiden.
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Kapuzinerkressenkraut, Meerrettichwurzel oder einen der sonstigen Bestandteile von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* sind. Die vollständige Liste der sonstigen Bestandteile finden Sie in Abschnitt 6.

**Besondere Vorsicht** bei der Einnahme von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* ist erforderlich:

- bei der Anwendung von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* bei Kindern unter 4 Jahren. Es liegen hierzu keine klinischen Studien mit Patienten dieser Altersgruppe vor. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

#### **Bei Einnahme von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit:**

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Nehmen Sie ANGOCIN® *Anti-Infekt N* während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein. Für ANGOCIN® *Anti-Infekt N* gibt es noch keine ausreichenden Daten über eine Verwendung während der Schwangerschaft. Es ist nicht bekannt, ob die Wirkstoffe von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* in die Muttermilch übergehen.

#### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### **Sonstige Hinweise:**

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Ihre Beschwerden nicht besser werden oder Nebenwirkungen auftreten.

### 3. WIE IST ANGOCIN® ANTI-INFEKT N EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie ANGOCIN® *Anti-Infekt N* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

3-5mal täglich je 4-5 Tabletten (Standarddosis: 3mal täglich 4 Tabletten). Kinder von 4 bis 8 Jahren nehmen 3-5mal täglich je 2-3 Tabletten ein (Standarddosis: 3mal täglich 2 Tabletten).

#### Art der Anwendung:

Nehmen Sie die Tabletten bitte unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit nach den Mahlzeiten ein.

#### Dauer der Anwendung:

Die Dauer der Anwendung von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* ist nicht begrenzt. Bei akuten Infekten empfehlen wir für Erwachsene und Kinder über 8 Jahren eine mehrtägige Stoßtherapie mit einem anschließenden „Ausschleichen“ der Medikation:

Hierzu nimmt man alle drei Stunden 4-5 Filmtabletten ein. Diese Dosis sollte über 3 bis 5 Tage beibehalten werden. Bessert sich nach dieser hohen Initialdosis das Befinden, kann die Dosis auf 3mal 4 Filmtabletten täglich reduziert werden. Diese Dosis sollte ca. 1 Woche lang beibehalten werden und danach (bei weiterer Stabilisierung des Gesundheitszustandes) auf 3mal 2 Filmtabletten täglich verringert werden (erneut 1 Woche lang). In der Regel ist danach der Organismus ausreichend gegen einen möglichen Rückfall stabilisiert, so dass die akute Therapie beendet werden kann.

Bei Infektanfälligkeit empfehlen wir danach eine prophylaktische Anwendung von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* (siehe unter „Prophylaxe mit ANGOCIN® *Anti-Infekt N*“).

#### Wichtiger Hinweis:

Tritt nach einer 5tägigen Initialtherapie keine merkliche Besserung ein, empfehlen wir dringend einen Arztbesuch, um eine Bestimmung der infektiösaushlösenden Erreger vorzunehmen und möglicherweise eine spezifische Antibiotikatherapie einzuleiten.



ANGOCIN® *Anti-Infekt N* kann und sollte während einer Antibiotikabehandlung weiterhin eingenommen werden, da das Arzneimittel aufgrund seiner antimikrobiellen Eigenschaften und seiner positiven Wirkung auf das Immunsystem (Steigerung der Abwehrkräfte) die Behandlung unterstützt.

**Prophylaxe mit ANGOCIN® *Anti-Infekt N*:**

Zur Vorbeugung bzw. zur Verhinderung eines erneuten Infektes (z. B. bei häufigen Blasenentzündungen) 2mal täglich 2 Filmtabletten.

Zur "Wintervorbereitung" des Immunsystems bzw. zur Grippeprophylaxe hat sich die tägliche Einnahme von 2 Filmtabletten zum Frühstück sehr bewährt. Man beginnt im Herbst des Jahres und setzt die Einnahme bis zum Ende des Winters fort.

**Wenn Sie eine größere Menge ANGOCIN® *Anti-Infekt N* eingenommen haben, als Sie sollten:**

Vergiftungen infolge einer Überdosierung sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn Sie versehentlich einmal mehr Tabletten als empfohlen eingenommen haben, so hat dies in der Regel keine nachteiligen Folgen. Bei Einnahme von deutlich darüber hinausgehenden Mengen benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Ihr Arzt wird über die notwendigen Maßnahmen entscheiden.

**Wenn Sie die Einnahme von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* vergessen haben:**

Wenn Sie eine Einnahme vergessen haben, nehmen Sie beim nächsten Mal nicht die doppelte Menge ein. Setzen Sie die Einnahme mit der nächsten Dosis so wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel kann ANGOCIN® *Anti-Infekt N* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem Patienten auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandler von 10  
Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100  
Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000  
Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000  
Sehr selten: weniger als 1 Behandler von 10.000

Bei ANGOCIN® *Anti-Infekt N* wurden folgende Nebenwirkungen beobachtet:

Häufig: Magen- und Darmbeschwerden wie Übelkeit, Oberbauchdruck, Durchfall, Blähungen oder Sodbrennen.  
Gelegentlich: Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautrötungen mit Hitzegefühl, Hautausschlag und/oder Juckreiz.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE IST ANGOCIN® ANTI-INFEKT N AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis (Durchdrückpackung) und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

**Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 30 °C lagern.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

**Was ANGOCIN® *Anti-Infekt N* enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

1 Filmtablette enthält: Kapuzinerkressenkrautpulver 200 mg, Meerrettichwurzelpulver 80 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind: Cellulose, Eisenoxide und -hydroxide E 172, Hypromellose, Kartoffelstärke, Macrogol, Natriumcarboxymethylstärke, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure, Talkum, Titandioxid E 171.

**Wie ANGOCIN® *Anti-Infekt N* aussieht und Inhalt der Packung:**

ANGOCIN® *Anti-Infekt N* sind hellbraune, runde überzogene Tabletten mit glatter und nach außen gewölbter Oberfläche.

Originalpackungen mit 50 (N1), 100 (N2), 200 (N3) und 500 überzogenen Tabletten.



**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

REPHA GmbH Tel.: 05 11 / 7 86 10-0  
Biologische Arzneimittel Fax: 05 11 / 7 86 10-99  
Alt-Godshorn 87 Internet: www.repha.de  
30855 Langenhagen E-Mail: info@repha.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2008.**

**Liebe Patientin, lieber Patient,**

**Kapuzinerkresse** und **Meerrettich** haben sich in der Behandlung von Infektionen der Harnwege und der Atemwege seit über 50 Jahren bewährt. Die Wirksamkeit dieser Pflanzen beruht auf einer Addition verschiedener Wirkmechanismen. Nachgewiesen sind:

- Eine direkte antibakterielle, antivirale und antimykotische (pilzhemmende) Wirkung aufgrund der in beiden Pflanzen enthaltenen sog. Senföle. Eine Schädigung der lebenswichtigen natürlichen Darmbakterien ist hierbei nicht zu befürchten, da die Wirkstoffe von ANGOCIN® *Anti-Infekt N* bereits in den oberen Darmabschnitten aufgenommen werden.
- Eine Inaktivierung bakterieller Giftstoffe (sog. Toxine) sowie auch eine Hemmung des Aufbaus solcher Stoffe.
- Eine Beeinflussung der Regulationsmechanismen des menschlichen Organismus durch unspezifische Reizwirkung im Sinne einer "Ankurbelung" aller Abwehrleistungen und Stoffwechselforgänge.

Auf Wunsch erhalten Sie gegen Einsendung von € 1,44 Rückporto in Briefmarken unseren 78seitigen Patientenratgeber „**Fieber, Schnupfen, Heiserkeit – es geht auch ohne viel Chemie**“ mit ausführlichen Informationen zum Thema Infektbehandlung und -prophylaxe.