

Mucoangin®

gegen Halsschmerzen
Waldbeere

20 mg/Lutschtablette

Wirkstoff: Ambroxolhydrochlorid

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen über 12 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Inhalt dieser Packungsbeilage:

1. Was ist MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere beachten?
3. Wie ist MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST MUCOANGIN GEGEN HALSSCHMERZEN WALDBEERE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ist ein Lokalanästhetikum (Halsschmerzmittel).

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere dient zur Schmerzlinderung bei akuten Halsschmerzen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MUCOANGIN GEGEN HALSSCHMERZEN WALDBEERE BEACHTEN?

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Ambroxol oder einen der sonstigen Bestandteile von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere sind
- wenn Sie eine Fructose-Unverträglichkeit haben, MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere

Obwohl es keinen Hinweis gibt, dass dies auch für die Anwendung von Ambroxol bei Halsschmerzen zutrifft, sollte bei Neuauftreten von Haut- oder Schleimhautveränderungen unverzüglich ärztlicher Rat eingeholt und vorsichtshalber die Behandlung mit Ambroxol beendet werden.

Kinder

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere sollte bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen in dieser Altersgruppe dokumentiert sind.

Einnahme von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine klinisch relevanten ungünstigen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Die gleichzeitige Gabe von Ambroxol und antibakteriell wirksamen Substanzen (Antibiotika wie Amoxicillin, Cefuroxim, Erythromycin, Doxycyclin) führt jedoch zu höheren Antibiotika-Konzentrationen im Lungengewebe.

Einnahme von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine relevanten Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Umfangreiche klinische Erfahrungen nach der 28. Schwangerschaftswoche haben keinen Hinweis auf eine schädigende Wirkung während der Schwangerschaft. Dennoch wird

- beachten?
3. Wie ist MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere einzunehmen?
 4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
 5. Wie ist MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere aufzubewahren?
 6. Weitere Informationen

1. WAS IST MUCOANGIN GEGEN HALSSCHMERZEN WALDBEERE UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ist ein Lokalanästhetikum (Halsschmerzmittel).

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere dient zur Schmerzlinderung bei akuten Halsschmerzen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON MUCOANGIN GEGEN HALSSCHMERZEN WALDBEERE BEACHTEN?

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Ambroxol oder einen der sonstigen Bestandteile von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere sind
- wenn Sie eine Fructose-Unverträglichkeit haben, da MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere Sorbitol enthält.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ist erforderlich:

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ist für die Behandlung von Geschwüren der Mundschleimhaut (Aphthen) nicht geeignet. In einem solchen Fall sollte ärztlicher Rat eingeholt werden.

Atemnot kann im Zusammenhang mit einer zugrunde liegenden Erkrankung, wie z. B. bei einer Schwellung des Rachens, beobachtet werden. Auch örtliche allergische Reaktionen (siehe Abschnitt 4: Schwellung von Haut und Schleimhaut) können eine Atemnot verursachen.

Die lokalanästhetischen Eigenschaften von Ambroxol können zu einer Veränderung der Geschmackswahrnehmung im Rachen beitragen (siehe Abschnitt 4: Taubheitsgefühl in Mund und Rachen).

Sehr selten ist im zeitlichen Zusammenhang mit der Anwendung von Substanzen mit Schleim lösender Wirkung (z. B. Ambroxol) über das Auftreten von schweren Hauterscheinungen wie Stevens-Johnson-Syndrom und Lyell-Syndrom bei der Anwendung dieser Substanzen zur Schleimlösung berichtet worden, welche in den meisten Fällen mit der Grundkrankheit bzw. mit der Begleitmedikation erklärt werden konnten.

Kinder

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere sollte bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen in dieser Altersgruppe dokumentiert sind.

Einnahme von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere zusammen mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine klinisch relevanten ungünstigen Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt. Die gleichzeitige Gabe von Ambroxol und antibakteriell wirksamen Substanzen (Antibiotika wie Amoxicillin, Cefuroxim, Erythromycin, Doxycyclin) führt jedoch zu höheren Antibiotika-Konzentrationen im Lungengewebe.

Einnahme von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Es sind keine relevanten Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Schwangerschaft

Umfangreiche klinische Erfahrungen nach der 28. Schwangerschaftswoche haben keinen Hinweis auf eine schädigende Wirkung während der Schwangerschaft ergeben. Dennoch wird MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere nicht während der Schwangerschaft, vor allem nicht während des ersten Schwangerschaftsdrittels, empfohlen.

Stillzeit

Der Wirkstoff Ambroxol geht in die Muttermilch über. Deshalb wird MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere für stillende Mütter nicht empfohlen, auch wenn unerwünschte Wirkungen beim gestillten Kind nicht zu erwarten sind.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Bei der Anwendung von MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere in der empfohlenen Dosierung (siehe Abschnitt 3.2) ist keine Beeinträchtigung zu erwarten.

3. WIE IST MUCOANGIN GEGEN HALSSCHMERZEN WALDBEERE EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Tagesdosis von bis zu 6 Lutschtabletten für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren nicht zu überschreiten.

Art und Dauer der Anwendung

Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum (zum Lutschen).

Nehmen Sie MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Tage ein.

Wenn Sie eine größere Menge MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere eingenommen haben, als Sie sollten

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Gelegentlich:	mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten:	mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten:	1 oder weniger von 10.000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle
Häufigkeit nicht bekannt:	Häufigkeit kann aus den verfügbaren Daten nicht berechnet werden

Nebenwirkungen

Immunsystem, Haut und Unterhautzellgewebe

Selten: allergische Reaktionen, vorwiegend als Hautausschlag

Sehr selten: schwere, akute allergische (anaphylaktische) Reaktionen

Häufigkeit nicht bekannt: Schwellung von Haut und Schleimhaut (Angioödem), Nesselsucht (Urtikaria)

Nervensystem

Gelegentlich: Geschmacksstörungen (z. B. Veränderung der Geschmackswahrnehmung)

Magen-Darm-Trakt

Gelegentlich: leichte Störungen des oberen Magen-Darm-Bereiches wie z. B. Sodbrennen, Verdauungsstörungen, Erbrechen, Übelkeit, trockener Mund, Taubheitsgefühl in Mund und Rachen

Wie bei allen Arzneimitteln, die Sorbitol enthalten, können erhöhte Stuhlfrequenz oder Durchfall auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST MUCOANGIN GEGEN HALSSCHMERZEN WALDBEERE AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Durchdrückpackung aufgedruckten Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen

Das Arzneimittel nicht bei Temperaturen über 30 °C aufbewahren.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere enthält

Der Wirkstoff ist:
Ambroxolhydrochlorid

Eine Lutschtablette enthält
20 mg Ambroxolhydrochlorid.

Die sonstigen Bestandteile sind:
Sorbitol 1,38 g (entspricht ca. 0,12 BE),
Macrogol 6000, Sucralose (E 955), Talkum,
Schwarze Johannisbeere-Aroma, Menthol-Aroma

Wie MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere aussieht und Inhalt der Packung

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere sind runde, weiße Tabletten mit abgerundeten Kanten. Beide Seiten sind flach.

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ist in Packungen mit 18 Lutschtabletten (N1) erhältlich.

MUCOANGIN gegen Halsschmerzen Waldbeere ist zuckerfrei.

Pharmazeutischer Unternehmer

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Vertriebslinie Thomae
Binger Str. 173
55216 Ingelheim am Rhein
Telefon: 0 800/77 90 900
Telefax: 0 61 32/72 99 99
www.mucoangin.de

Hersteller

Delpharm Reims
10 Rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims
Frankreich

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2008.

Sehr selten: schwere, akute allergische (anaphylaktische) Reaktionen

Häufigkeit nicht bekannt: Schwellung von Haut und Schleimhaut (Angioödem), Nesselsucht (Urtikaria)

Nervensystem
Gelegentlich: Geschmacksstörungen (z. B. Veränderung der Geschmackswahrnehmung)

Magen-Darm-Trakt
Gelegentlich: leichte Störungen des oberen Magen-Darm-Bereiches wie z. B. Sodbrennen, Verdauungsstörungen, Erbrechen, Übelkeit, trockener Mund, Taubheitsgefühl in Mund und Rachen

Wie bei allen Arzneimitteln, die Sorbitol enthalten, können erhöhte Stuhlfrequenz oder Durchfall auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Hersteller

Delpharm Reims
10 Rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims
Frankreich

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2008.