

ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG
D-89150 Laichingen



Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Aciclovir AL Creme

Wirkstoff: Aciclovir 50 mg/g Creme

Lesen Sie die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aciclovir AL Creme jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Aciclovir AL Creme und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aciclovir AL Creme beachten?
3. Wie ist Aciclovir AL Creme anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aciclovir AL Creme aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Aciclovir AL Creme und wofür wird sie angewendet?

Der Wirkstoff von Aciclovir AL Creme hemmt die Vermehrung von Herpes-Viren (Virustatikum).

Aciclovir AL Creme wird angewendet zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei rezidivierendem Herpes labialis (häufig wiederkehrende, durch Herpes simplex-Viren verursachte Lippenbläschen).

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aciclovir AL Creme beachten?

Aciclovir AL Creme darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile von Aciclovir AL Creme sind.

Aciclovir AL Creme darf nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle oder am Auge) aufgetragen werden, da sonst mit lokalen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aciclovir AL Creme ist erforderlich

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Aciclovir AL Creme nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn befragen.

Hinweis:

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte die Creme bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden.

Wenn die Bläschen bereits verkrustet sind, ist eine Behandlung mit Aciclovir AL Creme nicht mehr sinnvoll.

Bei Anwendung von Aciclovir AL Creme mit anderen Arzneimitteln

Für Aciclovir AL Creme sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Bei Anwendung von Aciclovir AL Creme zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Ungünstige Einflüsse von Genussmitteln, Speisen und Getränken sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Obwohl bei Tierversuchen keine teratogene (missbildende) Wirkung beobachtet wurde, sollte die Creme während der Schwangerschaft nur unter sorgfältiger Abwägung des Nutzens und möglicher Risiken angewendet werden.

Stillzeit

Die Anwendung der Creme während der Stillzeit im Brustbereich ist zu vermeiden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Direkte Einflüsse von Aciclovir AL Creme auf das Reaktionsvermögen und die Verkehrstüchtigkeit sind nicht bekannt.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Aciclovir AL Creme

Aciclovir AL Creme enthält Cetylalkohol und Propylenglycol. Cetylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z. B. Kontaktdermatitis) hervorrufen. Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. Wie ist Aciclovir AL Creme anzuwenden?

Wenden Sie Aciclovir AL Creme immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis

Die Creme wird 5-mal täglich alle 4 Stunden tagsüber auf die infizierten Hautbereiche dünn aufgetragen.

Art der Anwendung

Aciclovir AL Creme sollte mittels eines Wattestäbchens aufgetragen werden, indem dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestrichen wird.

Beim Auftragen sollte darauf geachtet werden, dass nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedeckt werden, sondern dass auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbezogen werden.

Falls das Auftragen mit der Hand erfolgt, sollte diese vorher und nachher gründlich gewaschen werden, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartien z. B. durch Bakterien bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut und Hautbereiche zu verhindern.

Dauer der Anwendung

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Kommt es während der Behandlung zu einer Verschlechterung der Hauterscheinungen oder sind spätestens nach 10 Tagen Behandlungsdauer die Bläschen nicht verkrustet oder abgeheilt, so ist die Behandlung abzubrechen und ein Arzt aufzusuchen.

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt. Halten Sie bitte diese Zeiten auch dann ein, wenn Sie sich bereits besser fühlen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Aciclovir AL Creme zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie die Anwendung von Aciclovir AL Creme vergessen haben

Wenn Sie einmal eine Anwendung vergessen haben, so führen Sie diese anschließend dennoch wie verordnet weiter (tragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Wenn Sie die Anwendung von Aciclovir AL Creme abbrechen

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Aciclovir AL Creme ausreichend lange anzuwenden. Bleibt die Behandlung jedoch erfolglos oder treten bestimmte Nebenwirkungen auf, so fragen Sie bitte einen Arzt um Rat (siehe auch Abschnitt 3. „Wie ist Aciclovir AL Creme anzuwenden?“ sowie Abschnitt 4. „Welche Nebenwirkungen sind möglich?“).

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Aciclovir AL Creme Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen

Haut und Unterhautzellgewebe

Nach der Anwendung von Aciclovir AL Creme können vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschuppung der mit Aciclovir AL Creme behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurden nach Anwendung der Aciclovir AL Creme vom Auftreten einer Kontaktdermatitis berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Cremegrundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als deren Ursache.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die oben genannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit der Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen.

Gegenmaßnahmen

Bitte informieren Sie Ihren Arzt über aufgetretene Nebenwirkungen, damit er diese ggf. spezifisch behandeln kann.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. Wie ist Aciclovir AL Creme aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und der Tube nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25°C lagern!

Nach Anbruch ist Aciclovir AL Creme bei sachgerechter Aufbewahrung 12 Monate haltbar!

6. Weitere Informationen

Was Aciclovir AL Creme enthält

Der Wirkstoff ist Aciclovir.

1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Die sonstigen Bestandteile sind: Cetylalkohol (Ph. Eur.), Dimeticon, dickflüssiges Paraffin, Macrogol-5-glycerolstearat, Propylenglycol, weißes Vaselin, gereinigtes Wasser.

Wie Aciclovir AL Creme aussieht und Inhalt der Packung

Weißer Creme.

Aciclovir AL Creme ist in Packungen mit 2 g Creme (N1) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

ALIUD® PHARMA GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 19 · D-89150 Laichingen
Internet: www.aliud.de · E-Mail: info@aliud.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im

April 2007

0407-01

9210827
0704