

# beta pharm

## Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!  
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin, Ihren Arzt, Ihre Apothekerin oder Ihren Apotheker.

## Aciclobeta<sup>®</sup> Lippenherpes

Creme

Aciclovir 50 mg / g Creme

### Zusammensetzung

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*  
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

### *Sonstige Bestandteile:*

Cetylalkohol, Dimeticon, Glycerolmonostearat, dickflüssiges Paraffin, Polyoxyethylen-30-stearat, Propylenglycol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser.

### Darreichungsform und Inhalt

Aciclobeta Lippenherpes ist in Originalpackungen mit 2 g Creme (N1) erhältlich.

### Stoff- oder Indikationsgruppe

Aciclobeta Lippenherpes ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virusstatikum).

### Pharmazeutischer Unternehmer

betapharm Arzneimittel GmbH  
Kobelweg 95, 86156 Augsburg  
Tel. 08 21/74 88 10, Fax 08 21/74 88 14 20

Herstellung im Auftrag der betapharm:  
C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG  
Frühlingstraße 7  
83620 Feldkirchen-Westerham

### Anwendungsgebiete

Zur lindern Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

### Gegenanzeigen

Aciclobeta Lippenherpes darf nicht auf Schleimhäute (z.B. in der Mundhöhle oder am Auge) aufgetragen werden, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

### Wann dürfen Sie Aciclobeta Lippenherpes erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Aciclobeta Lippenherpes nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutrafen.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Aciclobeta Lippenherpes oder werden in Ihrer Wirkung von Aciclobeta Lippenherpes beeinflusst?

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Aciclobeta Lippenherpes nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Aciclobeta Lippenherpes sonst nicht richtig wirken kann.

**Wie und wann sollten Sie Aciclobeta Lippenherpes anwenden?**

Sie sollten Aciclobeta Lippenherpes mittels eines Wattestäbchens auftragen, indem Sie dieses mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestreichen.

Beim Auftragen sollten Sie darauf achten, dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen.

Falls Sie das Auftragen mit der Hand vornehmen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z.B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

**Besonderer Hinweis**

Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollte Aciclobeta Lippenherpes bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) angewendet werden.

**Wie lange sollten Sie Aciclobeta Lippenherpes anwenden?**

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Im Einzelfall sollte die Behandlung solange erfolgen, bis die Bläschen verkrustet oder abgeheilt sind. Eine Behandlungsdauer von 10 Tagen sollte jedoch nicht überschritten werden.

**Überdosierung und andere Anwendungsfehler**

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Aciclobeta Lippenherpes angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?**

Setzen Sie die Behandlung wie in der Dosierungsanleitung beschrieben fort (tragen Sie die Creme z.B. nicht häufiger oder dicker auf).

**Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?**

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Aciclobeta Lippenherpes ausreichend lange anzuwenden (siehe auch „Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung“).

**Nebenwirkungen**

**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Aciclobeta Lippenherpes auftreten?**

Nach der Anwendung von Aciclobeta Lippenherpes kann vorübergehendes Brennen oder Stechen auf den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötung, Eintrocknung und Abschuppung der mit Aciclobeta Lippenherpes behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von Aciclobeta Lippenherpes vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die obengenannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit der Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In solchen Fällen sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, auch solche, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels**

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

**Wie ist Aciclobeta Lippenherpes aufzubewahren?**

Bewahren Sie Aciclobeta Lippenherpes nicht über 25 °C und für Kinder unzugänglich auf!

**Wann ist Aciclobeta Lippenherpes auch vor Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwendbar?**

Aciclobeta Lippenherpes ist nicht mehr verwendbar, wenn die Emulsion zerstört ist.

**Stand der Information**

Juli 2007

102313  
0-11157-00

90502300