



Liebe Patientin, lieber Patient!

017456/5004 GP DE

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Angin-Heel[®]

SD

Zusammensetzung: 1 Tablette enthält: *Arzneilich wirksame Bestandteile:* Hydrargyrum bichloratum Trit. D8 30 mg, Phytolacca americana Trit. D4 30 mg, Apis mellifica Trit. D4 30 mg, Arnica montana Trit. D4 30 mg, Hepar sulfuris Trit. D6 60 mg, Atropa bella-donna Trit. D4 60 mg. Die Bestandteile werden über die letzten 2 Stufen als Verreibung gemeinsam potenziert.

Sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Magnesiumstearat.

Tabletten 50/250

Indikationsgruppe: Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden

Telefon: 0 72 21/501-00

Telefax: 0 72 21/501-690

Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Mandelentzündungen.

Hinweis: Bei häufig wiederkehrenden Mandelentzündungen und länger als 3 Tage anhaltendem oder über 39 °C ansteigendem Fieber sollte wie bei allen unklaren oder anhaltenden Beschwerden ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen: *Wann ist Angin-Heel SD nicht anzuwenden?* Angin-Heel SD ist bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Korbblütler nicht anzuwenden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten? Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt eingenommen werden.

Wechselwirkungen: *Welche Genussmittel, Speisen und Getränke sollten Sie meiden?* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Angin-Heel SD nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Angin-Heel SD sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Angin-Heel SD und wie oft sollten Sie Angin-Heel SD anwenden? 3mal täglich 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen. Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen.

-Heel



Kinder erhalten die in der folgenden Tabelle angegebene Dosierung:

Altersgruppe	Normaldosierung	Akutdosierung
Säuglinge 0–12 Monate	nach Rücksprache mit dem Arzt 2mal täglich 1/2 Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen.	nach Rücksprache mit dem Arzt alle 1–2 Stunden, höchstens 8mal täglich, 1/2 Tablette zerkleinern und in Wasser aufgelöst einnehmen lassen.
Kleinkinder 1–5 Jahre	3mal täglich 1/2 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.	alle 1–2 Stunden, höchstens 12mal täglich, 1/2 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.
Schulkinder 6–11 Jahre	2mal täglich 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.	alle 1–2 Stunden, höchstens 8mal täglich, 1 Tablette langsam im Mund zergehen lassen.
Kinder ab 12 Jahre	Erwachsenendosierung	Erwachsenendosierung

Wie lange sollten Sie Angin-Heel SD anwenden? Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

Hinweise für den Fall der Überdosierung: Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen: Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Angin-Heel SD auftreten? Nach Einnahme kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen? Bitte setzen Sie zunächst das Präparat ab und befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels: Das Verfalldatum dieser Packung ist auf Behältnis und äußere Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information: 05/2005

Zusätzliche Hinweise für den Patienten:

Heel-Arzneimittel sind überwiegend homöopathische Kombinationspräparate (sogenannte Antihomotoxika). Sie enthalten Wirkstoffe unter anderem aus dem Pflanzen- und Mineralreich. Diese antihomotoxischen Arzneimittel wurden aufbauend auf der Homöopathie Hahnemanns und den Erkenntnissen der Homotoxinlehre Dr. Reckewegs zusammengestellt. Sie bewirken eine Aktivierung und Normalisierung der körpereigenen Abwehrkräfte und Funktionen. Die antihomotoxische Medizin ist eine spezielle Form der Homöopathie, die körpereigenen und von außen zugeführten Schadstoffen (= Homotoxine) entgegenwirkt.

Weitere Informationen zur antihomotoxischen Medizin erhalten Sie kostenfrei bei:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 10 03 49 · D-76484 Baden-Baden

