

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Aknefug® Liquid 1 %

1 g Salicylsäure pro 100 ml Lösung
Zur Anwendung bei Kindern über 4 Jahre und Erwachsenen.

Liebe Patientin, lieber Patient, lesen Sie bitte die gesamte Gebrauchsinformation sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aknefug Liquid 1% jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Gebrauchsinformation auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Gebrauchsinformation beinhaltet:

1. Was ist Aknefug Liquid 1 % und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aknefug Liquid 1 % beachten?
3. Wie ist Aknefug Liquid 1 % anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknefug Liquid 1 % aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST AKNEFUG LIQUID 1 % UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Aknefug Liquid 1 % ist eine schälende und antibakterielle Lösung zur Anwendung auf der Haut. Aknefug Liquid 1 % wird angewendet zur Linderung leichter, beginnender Akne.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON AKNEFUG LIQUID 1 % BEACHTEN?

Aknefug Liquid 1 % darf nicht angewendet werden

- bei Überempfindlichkeit gegen Salicylsäure, Salicylate und Propylenglycol oder einem der sonstigen Bestandteile von Aknefug Liquid 1 % (siehe Abschnitt 6 „Weitere Informationen“),
- bei Säuglingen sowie bei Kindern, die das 4. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
- bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Hier darf Aknefug Liquid 1 % nur in Ausnahmefällen kleinflächig auf einer Körperfläche von maximal 10 cm² höchstens 3 Tage angewendet werden.
- auf Schleimhäuten, im Mund, im oder am Auge so-

wie im Genitalbereich sowie innerlich, da es u. a. 2-Propanol enthält.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aknefug Liquid 1 % ist erforderlich

- da bei Kindern über 4 Jahren eine Tagesdosis von 0,2 g Salicylsäure (= 20 ml Aknefug Liquid 1 %) nicht überschritten werden darf.

Bei Anwendung von Aknefug Liquid 1 % mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Salicylsäure kann die Aufnahme anderer auf die Haut aufgetragener Arzneimittel verstärken.

Schwangerschaft und Stillzeit

Aknefug Liquid 1 % darf in der Schwangerschaft nur kleinflächig (Fläche kleiner als 5 cm²) angewendet werden.

Aknefug Liquid 1 % darf nicht an der stillenden Brust angewendet werden. Die zufällige Aufnahme von Salicylsäure durch den Säugling durch Kontakt mit der behandelten Körperstelle muss vermieden werden. Sollte der Arzt eine regelmäßige Behandlung großer Hautflächen mit Aknefug Liquid 1 % für notwendig halten, ist frühzeitig abzustillen, da Risiken wegen mangelnder Entgiftung bei Neugeborenen nicht auszuschließen sind.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Aknefug Liquid 1 %

Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. WIE IST AKNEFUG LIQUID 1 % ANZUWENDEN?

Wenden Sie Aknefug Liquid 1 % immer genau nach der Anweisung in dieser Gebrauchsinformation an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Aknefug Liquid 1 % ist eine Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wird Aknefug Liquid 1 % 1- bis 2-mal täglich dünn auf die erkrankten Hautpartien aufgetragen.

Bei jeder Anwendung verfahren Sie bitte wie folgt:

- Reinigen Sie zunächst Ihre Haut und trocknen Sie sie dann ab.

- Tränken Sie einen Wattebausch mit Aknefug Liquid 1 %.
- Tupfen oder reiben Sie Ihre Haut mit dem Wattebausch so ab, dass auf den erkrankten Hautstellen ein dünner Flüssigkeitsfilm von Aknefug Liquid 1 % entsteht.

Dauer der Anwendung

Aknefug Liquid 1 % ist nach ärztlicher Anweisung bzw. bis zur Abheilung der Erkrankung anzuwenden.

Wenn Sie eine größere Menge Aknefug Liquid 1 % angewendet haben als Sie sollten

Setzen Sie die Behandlung beim nächsten Mal mit der normalen Menge fort.

Vergiftungen nach örtlich begrenzter Anwendung von Aknefug Liquid 1 % sind bisher nicht bekannt geworden.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Aknefug Liquid 1 % sind Salicylsäure-Blutspiegel über 5 mg/dl und Vergiftungen (Intoxikationen) nicht zu erwarten.

Mit Vergiftungssymptomen ist erst ab Blutspiegeln von mehr als 30 mg/dl zu rechnen. Dann können Ohrensausen, Ohrgeräusche, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Reizbarkeit sowie Trockenheitsgefühl der Schleimhäute auftreten. Als Gegenmaßnahme genügt das Absetzen des Präparates.

Bei versehentlichem oder beabsichtigtem Trinken größerer Mengen von Aknefug Liquid 1 % können insbesondere bei Kindern Maßnahmen zur Entgiftung erforderlich werden. Benachrichtigen Sie Ihren Arzt. Gegebenenfalls sollte eine Vergiftungszentrale angerufen werden.

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Liquid 1 % vergessen haben

Nach einer vergessenen Einzeldosis wenden Sie bitte nicht die doppelte Menge von Aknefug Liquid 1 % an, sondern nehmen die Behandlung mit der vorgesehenen Dosis wieder auf.

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Liquid 1 % abbrechen

Wenn Sie die Anwendung von Aknefug Liquid 1 % abbrechen, sprechen Sie Ihren Arzt oder Apotheker an. Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Aknefug Liquid 1 % Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bedeutende Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, wenden Sie Aknefug Liquid 1 % nicht weiter an und suchen Sie Ihren Arzt möglichst umgehend auf.

Sehr selten (weniger als 1 Behandler von 10000) können allergische Hautreaktionen auftreten.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Selten (1 bis 10 Behandelte von 10000) können Hautreizungen in Form von Brennen, Rötungen, Juckreiz, Austrocknung der Haut auftreten.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST AKNEFUG LIQUID 1 % AUFZUBEWAHREN?

Das Arzneimittel ist für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Flaschenetikett angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C lagern. Glasflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Wochen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Aknefug Liquid 1 % enthält

Der Wirkstoff ist Salicylsäure.

100 ml Lösung enthalten als Wirkstoff 1 g Salicylsäure (Ph. Eur.)

Die sonstigen Bestandteile sind:

2-Propanol (Ph. Eur.), Propylenglycol, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser.

Wie Aknefug Liquid 1 % aussieht und Inhalt der Packung:

Aknefug Liquid 1 % ist eine klare, farblose Lösung in Glasflaschen.

Die Packungen enthalten 100 ml Lösung zur Anwendung auf der Haut.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel
Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

Telefon: (0521) 8808-05

Fax: (0521) 8808-334

E-Mail: info@wolff-arzneimittel.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2007

DR·WOLFF