

Tannalbin® Tabletten

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Tannalbin® Tabletten

Wirkstoff: Tannin-Eiweiß

Zusammensetzung

1 Tablette enthält:

Arzneilich wirksamer Bestandteil: Tannin-Eiweiß 500 mg (entspricht 450 – 485 mg Trockenmasse)

Sonstige Bestandteile: Gelatine, hochdisperses Siliciumdioxid, Stearinsäure.

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 20 Tabletten und mit 50 Tabletten.

Stoff- oder Indikationsgruppe, Wirkungsweise

Magen-Darm-Mittel/Antidiarrhoikum

Pharmazeutischer Unternehmer:

MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Telefon (023 71) 937-0, Telefax (023 71) 937-329

e-Mail: info@medice.de, www.medice.de

Anwendungsgebiete

Unterstützende Behandlung bei akuten unspezifischen Durchfällen (Diarrhöen), wie sie z. B. bei Reisen in warme Länder, Ernährungsumstellungen, plötzlichem Klimawechsel usw. auftreten können.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Tannalbin Tabletten nicht einnehmen?

Sie dürfen Tannalbin Tabletten nicht einnehmen bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe oder Hühnereiweiß.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Tannalbin Tabletten soll in der Schwangerschaft nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den behandelnden Arzt angewendet werden. Tannalbin Tabletten soll in der Stillzeit nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den behandelnden Arzt angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Bei Kindern und älteren Menschen können Durchfälle, insbesondere in Kombination mit Erbrechen, in kürzester Zeit zu einem gefährlichen Wasser- und Elektrolytverlust führen. Deshalb muss besonders auf ausreichenden Ersatz von Wasser und Elektrolyten geachtet werden.

Bei schwer verlaufenden Durchfällen, besonders wenn sie mit Fieber und/oder blutigen Stühlen einhergehen, ist ein Arzt zu konsultieren, da eine spezifische Behandlung erforderlich werden kann.

Worauf müssen Sie noch achten?

Die Wirkung von Tannalbin Tabletten wird durch Diät unterstützt. Neben der bereits genannten Sicherstellung einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr, sollte insbesondere schlackenreiche und stark gewürzte Kost vermieden werden.

Da Tannin-Eiweiß, der Wirkstoff in Tannalbin Tabletten, aus Naturprodukten hergestellt wird, können bei Tabletten verschiedener Herstellungsgänge (Chargen) leichte Farbunterschiede auftreten. Auf die Wirksamkeit des Produktes hat dieses unterschiedliche Aussehen jedoch keinen Einfluss.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Tannalbin Tabletten bzw. wie beeinflussen Tannalbin Tabletten die Wirkung von anderen Arzneimitteln?

Eisenhaltige Präparate sollten nicht gleichzeitig mit Tannalbin Tabletten eingenommen werden, sondern um mehrere Stunden versetzt, da ansonsten die Wirkung des Eisenpräparates vermindert werden kann.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Tannalbin Tabletten nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tannalbin Tabletten sonst nicht richtig wirken können.

Wie viel von Tannalbin Tabletten und wie oft sollten Sie Tannalbin Tabletten einnehmen?

Die Dosis und die Häufigkeit richten sich nach dem Schweregrad der Durchfallerkrankung.

Soweit nicht anders verordnet, nehmen:

Kinder 5-12 Jahren:

1 Tablette 4 bis 6mal täglich

Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene:

1-2 Tabletten 4 bis 6mal täglich

Hinweis:

Bei Durchfällen bei Kindern, die länger als 24 Stunden anhalten oder mit Erbrechen einhergehen, sollte unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Wie und wann sollten Sie Tannalbin Tabletten einnehmen?

Die Tabletten werden vor oder zu den Mahlzeiten mit genügend Flüssigkeit eingenommen. Bei Bedarf können Sie die Tabletten auch zerkleinern und mit Speisen oder Getränken vermischen.

Wie lange sollten Sie Tannalbin Tabletten einnehmen?

Tannalbin Tabletten sollten bis zum Abklingen des Durchfalls regelmäßig eingenommen werden.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was ist zu tun, wenn Tannalbin Tabletten in zu großen Mengen eingenommen wurden (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Tannalbin Tabletten führen auch bei Überdosierung nicht zu Verstopfungen. Schwerwiegende Gesundheitsstörungen als Folge von Überdosierung sind bisher nicht bekannt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zuwenig Tannalbin Tabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Nehmen Sie beim nächsten Mal nicht etwa die doppelte Menge ein, sondern führen Sie die Einnahme, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben, fort.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Tannalbin Tabletten auftreten?

In seltenen Fällen wurden allergische Reaktionen (Überempfindlichkeitsreaktionen) auf Tannin-Eiweiß beobachtet.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Im Falle von Nebenwirkungen sollten Sie das Präparat absetzen und sich von Ihrem Arzt beraten lassen.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum ist auf der Durchdrückpackung und der Faltschachtel angegeben. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie sind Tannalbin Tabletten aufzubewahren?

Nicht über 25 °C aufbewahren.

Achten Sie stets darauf, das Arzneimittel so aufzubewahren, dass es für Kinder nicht zu erreichen ist!

Stand der Information: Juli 2006

Liebe Patientin, lieber Patient,

Durchfall ist ein Symptom mit vielen Ursachen. Kennzeichnend für Durchfall sind im Allgemeinen mehr als 3 Stuhlentleerungen pro Tag sowie wässrige oder breiige Stühle. Ursachen können unter anderem Ernährungsumstellung auf Reisen, Infektionen mit Bakterien oder Viren, Allergien gegen bestimmte Lebensmittel oder psychische Belastungen wie Stress, Ärger oder Angst sein. Die Folgen sind in der Regel eine erhöhte Wasserabgabe oder eine verminderte Wasseraufnahme im Darm.

Der arzneilich wirksame Bestandteil von Tannalbin Tabletten, Tannin-Eiweiß, bewirkt eine Abdichtung der entzündeten Darmschleimhaut und beugt so weiteren Flüssigkeitsverlusten vor. Dadurch kann es zu einer Normalisierung der Stuhlbeschaffenheit und der Stuhlentleerungen kommen.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Ihre MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Kuhlweg 37, 58638 Iserlohn