

Gebrauchsinformation


Cefasept® S

Flüssige Verdünnung zur Injektion



Cefak KG

Postfach 13 60
D-87403 Kempten



Zusammensetzung:

1 Amp. zu 1 g (= 1 ml) enth.: *Arzneilich wirksame Bestandteile:*

Echinacea Ø	10 mg
Kalium phosphoricum dil. D 4	100 mg
Lachesis mutus dil. D 6	100 mg

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Darreichungsform und Inhalt:

Flüssige Verdünnung zur sc., im., iv. Injektion

10 bzw. 50 bzw. 100 Ampullen zu 1 ml.

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Cefak KG, Ostbahnhofstr. 15, 87437 Kempten

Telefon: 0831/57401-0, Telefax: 0831/57401-50

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehören: Entzündungen der oberen Atemwege.

Bei Beschwerden, die länger als 3 Tage anhalten, Atemnot, bei Fieber über 39° C oder eitrigem oder blutigem Auswurf, sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei Diabetes mellitus.


Aus grundsätzlichen Überlegungen darf Cefasept® S nicht angewendet werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie ähnlichen Erkrankungen (Leukosen), entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, Multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Cefasept® S in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

b.w.



Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Warnhinweise:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet: Täglich 1 - 2 ml intramuskulär, subkutan oder intravenös injizieren.

Art und Dauer der Anwendung:

Cefasept® S sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 3 Wochen angewendet werden.

Der Ampulleninhalt wird subkutan, intramuskulär oder intravenös injiziert.

Nebenwirkungen:

In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Arzneimittel sollen für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Stand der Information: März 2007

Packungsgrößen:

Ampullen (1 ml) zu 10 St., 50 St., 100 St.

TAF