



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 6251) 10 97-0 · Fax (06251) 3342  
<http://www.reckeweg.de>

*Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.*

## GEBRAUCHSINFORMATION

### Fucus-Gastreu® S R59

Wirkstoff: Fucus vel Ascophyllum e thallo sicc. Dil. D2

#### Zusammensetzung:

10 g (entsprechend 10,5 ml) enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: Fucus vel Ascophyllum e thallo sicc. Dil. D2 [HAB, V. 4 a, Ø mit Ethanol 86 % (m/m)] 1 g. Sonstige Bestandteile: Ethanol 43 Prozent (m/m).

1 ml entspricht 21 Tropfen.

22 ml / 50 ml Mischung zum Einnehmen

#### Stoff- und Indikationsgruppe:

Homöopathisches Arzneimittel

#### Pharmazeutischer Unternehmer/Hersteller

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim  
Tel.: 0 6251 / 10 97-0 · Fax: 0 6251 / 3342  
<http://www.reckeweg.de>

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Zur unterstützenden Behandlung bei nicht krankheitsbedingtem Übergewicht.

*Hinweis:* Bei allen unklaren und plötzlich einsetzenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung und Behandlung bedürfen.

#### Gegenanzeigen:

Jodüberempfindlichkeit. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden. Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise.

#### Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Die Einnahme des Arzneimittels sollte nicht ohne Rücksprache mit dem Arzt erfolgen und ersetzt nicht andere diesbezüglich verordnete Maßnahmen, wie z.B. eine Diät und körperliche Bewegung.

Kinder: Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.



Schwangerschaft und Stillzeit: Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Enthält 55 Vol.-% Alkohol.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

**Keine bekannt.**

*Allgemeiner Hinweis:* Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Medikamente einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Dosierungsanleitung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Fucus-Gastreu® S R59** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da **Fucus-Gastreu® S R59** sonst nicht richtig wirken kann!

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen.

Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

**Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

**Anwendungsfehler und Überdosierung:**

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes dieses Arzneimittels werden bis zu 9,6 g (22 ml) bzw. 22,4 g (50 ml) Alkohol aufgenommen. Dies kann insbesondere bei Kindern zu Unruhe, Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit oder Müdigkeit führen. In diesem Fall sollte Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

**Nebenwirkungen:**

Eine Schilddrüsenüberfunktion kann verstärkt werden. In sehr seltenen Fällen kann es zu Übelkeit, Magen-Darm-Beschwerden, Schwindel, Blutdruckerhöhung kommen.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Nach Ablauf des auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums ist das Arzneimittel nicht mehr anzuwenden.

**Aufbewahrung:** Bei Raumtemperatur.

Stand der Information: August 2006

---

**Arzneimittel müssen unzugänglich für Kinder aufbewahrt werden.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6277552.00.00

**Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.**