


Gebrauchsinformation



Bronchikatt



Homöopathisches Arzneimittel

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält:

arzneilich wirksame Bestandteile:

Cephaelis ipecacuanha Trit.

D 4 31,25 mg

Drosera Trit.

D 4 31,25 mg

Kalium chloratum Trit.

D 4 31,25 mg

Kalium iodatum Trit.

D 4 31,25 mg

Kreosotum Trit.

D 4 31,25 mg

sonstige Bestandteile:

Lactose, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat

Darreichungsform und Inhalt:

50, 100 Tabletten zum Einnehmen

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

Pharm. Fabrik Kattwiga GmbH, Postfach 2567, 48514 Nordhorn

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Entzündungen der Atemwege wie z.B. Bronchitis.

Bei Fieber, eitrigem oder blutigem Auswurf, sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.


Gegenanzeigen:

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Jod. Bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Bronchikatt in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

keine bekannt



Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene bei akuten Zuständen 1 Tablette alle halbe bis ganze Stunde, jedoch höchstens 12 mal täglich, bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette ein. Zur Verbesserung der Wirksamkeit sollte man die Tablette im Mund zergehen lassen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweis für den Fall der Überdosierung:

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Nebenwirkungen:

keine bekannt

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis: Bei Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis und der äußeren Umhüllung aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum.

Stand der Information: August 2002