

# Tonsipret® Tabletten



## Tabletten zum Einnehmen

Wirkstoff(e):	Capsicum annuum	Dil. D 3	75,0 mg
	Guaiacum	Dil. D 3	75,0 mg
	Phytolacca americana	Ø	50,0 mg

Zur Anwendung bei Kindern und Erwachsenen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Tonsipret Tabletten jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihre/n Apothekerin/Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall eine/n Ärztin/Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker.



### Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was sind Tonsipret Tabletten und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Tonsipret Tabletten beachten?
3. Wie sind Tonsipret Tabletten einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Tonsipret Tabletten aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

### 1. WAS SIND TONSIPIRET TABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Tonsipret Tabletten sind ein homöopathisches Arzneimittel bei entzündlichen Erkrankungen des Rachens. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Hals- und Mandelentzündung (Tonsillitis).

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sowie bei Fieber, das länger als drei Tage bestehen bleibt oder über 39°C ansteigt, sollte eine Ärztin/Ärztin aufgesucht werden.

### 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON TONSIPIRET TABLETTEN BEACHTEN?

#### Tonsipret Tabletten dürfen nicht eingenommen werden bei:

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehältes an Lactose ungeeignet für Patienten, die an der selten vorkommenden erblichen Galactose-Unverträglichkeit (Galactose-Intoleranz), einem genetischen Lactasemangel oder einer Glucose-Galactose-Malabsorption leiden.

#### Bei Einnahme von Tonsipret Tabletten mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/ anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

#### Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihre/n Ärztin/Arzt.

#### Bei Einnahme/Anwendung von Tonsipret Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Entfällt

#### Schwangerschaft und Stillzeit:

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker um Rat. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit der/m Ärztin/Arzt angewendet werden.

#### Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

#### Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Tonsipret Tabletten:

Keine

### 3. WIE SIND TONSIPIRET TABLETTEN EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie Tonsipret Tabletten immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrer/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Tonsipret Tabletten sonst nicht richtig wirken können!

Wieviel von Tonsipret Tabletten und wie oft sollten Sie Tonsipret Tabletten einnehmen?

#### Soweit nicht anders verordnet:

	Bei akuten Zuständen	Bei chronischen Zuständen
<b>Erwachsene:</b>	Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 1 Tablette	1 – 3 mal täglich je 1 Tablette
<b>Kinder zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr</b>	Erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis (höchstens 8 mal täglich je 1 Tablette)	Erhalten nicht mehr als zwei Drittel der Erwachsenenendosis (höchstens 2 mal täglich je 1 Tablette)
<b>Kleinkinder bis zum 6. Lebensjahr</b>	Erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis (höchstens 6 mal täglich je 1 Tablette)	Erhalten nicht mehr als die Hälfte der Erwachsenenendosis (höchstens 1 – 2 mal täglich je 1 Tablette)



Die Tabletten langsam im Mund zergehen lassen.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Bitte sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt oder Apothekerin/Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Tonsipret Tabletten zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Tonsipret Tabletten eingenommen haben, als Sie sollten

Bei der Einnahme größerer Mengen des Arzneimittels (gesamte Packung mit 100 oder 200 Tabletten) kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder eine abführende Wirkung auftreten.

Wenn Sie die Einnahme von Tonsipret Tabletten vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker.

**4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?**

Wie alle Arzneimittel können Tonsipret Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

<b>Sehr häufig:</b>	mehr als 1 von 10 Behandelten
<b>Häufig:</b>	weniger als 1 von 10, aber mehr als 1 von 100 Behandelten
<b>Gelegentlich:</b>	weniger als 1 von 100, aber mehr als 1 von 1000 Behandelten
<b>Selten:</b>	weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10 000 Behandelten
<b>Sehr selten:</b>	weniger als 1 von 10 000 Behandelten, einschließlich Einzelfälle

Bedeutende Nebenwirkungen oder Zeichen, auf die Sie achten sollten, und Maßnahmen, wenn Sie betroffen sind:

Wenn Sie von einer der nachfolgend genannten Nebenwirkungen betroffen sind, nehmen Sie Tonsipret Tabletten nicht weiter ein und suchen Sie Ihre/n Ärztin/Arzt möglichst umgehend auf.

In seltenen Fällen können Übelkeit und Magenbeschwerden auftreten. Sehr selten wurden allergische Hautreaktionen berichtet.

Hinweis:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihre/n Ärztin/Arzt befragen.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihre/n Ärztin/Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrer/Ihrem Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker mit.

Andere mögliche Nebenwirkungen

Informieren Sie bitte Ihre/n Ärztin/Arzt oder Apothekerin/Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

**5. WIE SIND TONSIPRET TABLETTEN AUFZUBEWAHREN?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel bzw. Blister angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch oder Zubereitung:

Keine

**6. WEITERE INFORMATIONEN**

Was Tonsipret Tabletten enthalten:

Die Wirkstoffe sind: In 1 Tablette sind verarbeitet:

Arzneilich wirksame Bestandteile:

Capsicum annuum	Dil. D 3	75,0 mg
Guaiaecum	Dil. D 3	75,0 mg
Phytolacca americana	Ø	50,0 mg

Die sonstige Bestandteile: Lactose-Monohydrat, Kartoffelstärke, Magnesiumstearat

Wie Tonsipret Tabletten aussehen und Inhalt der Packung:

Tonsipret Tabletten sind in Originalpackungen mit 50 (N1), 100 (N1), 200 (N2) Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer:

**BIONORICA AG**  
Kerschensteinerstraße 11-15  
92318 Neumarkt  
Telefon: 09181/231-90  
Telefax: 09181/231-265  
Internet: www.bionorica.de  
E-mail: info@bionorica.de

Hersteller:

**BIONORICA AG**  
Kerschensteinerstraße 11-15  
92318 Neumarkt  
Telefon: 09181/231-90  
Telefax: 09181/231-265  
Internet: www.bionorica.de  
E-mail: info@bionorica.de

Mitvertrieb:

**PLANTAMED Arzneimittel GmbH**  
Kerschensteinerstraße 11-15  
92318 Neumarkt  
Telefon: 09181/231-0  
Telefax: 09181/21850

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juli 2006.