

## 6. WEITERE INFORMATIONEN

### Was selenase® 50 AP enthält:

Der Wirkstoff ist:

1 Tablette enthält 0,167 mg Natriumselenit 5 H<sub>2</sub>O, entsprechend 50 µg Selen.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gelatine, Magnesiumstearat, Maisstärke, Saccharose, Talkum.

### Wie selenase® 50 AP aussieht und Inhalt der Packung:

Durchdrückpackungen aus PVC-Verbundfolie und Aluminiumfolie mit weißen Tabletten.

Originalpackungen mit 20 (N1), 50 (N2) und 100 (N3) Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Str. 32

D-70734 Fellbach

Tel. (0711) 575 32 00

Fax (0711) 575 32 99

E-Mail: info@biosyn.de

http://www.biosyn.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Mai 2007.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Apothekenpflichtig.

Material-Nr.: 49124

Druck-Nr. ( Tx-20735 ) - Druck: Juni 2007



biosyn Arzneimittel GmbH  
biosyn Schorndorfer Straße 32, D-70734 Fellbach

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

## selenase® 50 AP

Wirkstoff: Natriumselenit 5 H<sub>2</sub>O

50 µg Selen pro Tablette

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss selenase® 50 AP jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist selenase® 50 AP und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von selenase® 50 AP beachten?
3. Wie ist selenase® 50 AP einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist selenase® 50 AP aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

(bitte wenden)





## 1. WAS IST selenase® 50 AP UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

selenase® 50 AP ist ein Spurenelement-Präparat.

Anwendungsgebiet: Nachgewiesener Selenmangel, der ernährungsmäßig nicht behoben werden kann.

Ein Selenmangel kann auftreten bei:

- Maldigestions- und Malabsorptionszuständen,
- Fehl- und Mangelernährung.

## 2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON selenase® 50 AP BEACHTEN?

**selenase® 50 AP soll nicht eingenommen werden** bei Selenvergiftungen.

**Bei Einnahme von selenase® 50 AP mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Das in selenase® 50 AP enthaltene Natriumselenit-Pentahydrat kann bei gleichzeitiger Einnahme von Mineralstoffen bzw. Spurenelementen deren Wirksamkeit herabsetzen. Die gleichzeitige Einnahme von Vitamin C sollte vermieden werden. Die getrennte Einnahme von selenase® 50 AP und z. B. Vitamin C mit Abstand von mindestens 1 Stunde ist jedoch möglich.

**Warnhinweise:**

Keine.

**Schwangerschaft und Stillzeit:**

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine Einschränkungen.

## 3. WIE IST selenase® 50 AP EINZUNEHMEN?

Nehmen Sie selenase® 50 AP immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:  
Täglich 1 Tablette (entsprechend 50 µg Selen).

Die Einnahme erfolgt mit reichlich Flüssigkeit zur Hauptmahlzeit.

Über die Dauer der Behandlung entscheidet der behandelnde Arzt.

**Was ist zu tun, wenn selenase® 50 AP in zu großen Mengen eingenommen wurde?**

Anzeichen einer akuten Überdosierung sind knoblauchartiger Mundgeruch, Müdigkeit, Übelkeit, Diarrhö und Ober- und Unterbauchbeschwerden.

Gegenmaßnahmen

Magenspülung oder erzwungene Diurese (gesteigerte Harnausscheidung).

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

## 4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.

## 5. WIE IST selenase® 50 AP AUFZUBEWAHREN?

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Durchdrückpackung nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

**Aufbewahrungsbedingungen**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

(bitte wenden)

