

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Gurgellösung-ratiopharm®

Wirkstoff: Dequaliniumchlorid 0,01 %

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Gurgellösung-ratiopharm® jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Gurgellösung-ratiopharm® und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Gurgellösung-ratiopharm® beachten?
3. Wie ist Gurgellösung-ratiopharm® anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Gurgellösung-ratiopharm® aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST Gurgellösung-ratiopharm® UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Gurgellösung-ratiopharm® ist ein Mund- und Rachentherapeutikum.

Gurgellösung-ratiopharm® wird angewendet

zur unterstützenden Behandlung von bakteriellen Entzündungen der Schleimhaut von Mund und Rachen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Gurgellösung-ratiopharm® BEACHTEN?

Gurgellösung-ratiopharm® darf nicht angewendet werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Dequaliniumchlorid, Propylenglycol, Zimt (Zimtaldehyd) oder einem der sonstigen Bestandteile von Gurgellösung-ratiopharm® sind. Das gilt auch, wenn Sie auf Perubalsam überempfindlich reagieren (Kreuz-Allergie).
- bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes).
- wenn Sie unter Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen leiden, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Gurgellösung-ratiopharm® kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Gurgellösung-ratiopharm® ist erforderlich

Wenn Ihre Beschwerden von Fieber begleitet werden oder nicht nach spätestens 3 Tagen erheblich nachlassen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen, da eine behandlungsbedürftige Mandelentzündung vorliegen könnte, die ernste Folgekrankheiten an Herz und Nieren auslösen kann.

Vermeiden Sie, dass Ihnen die Gurgellösung ins Auge gerät.

Wenn Sie unter Kontaktallergien leiden, sollten Sie die Gurgellösung nicht anwenden, da eine Sensibilisierung möglich ist.

Bei Anwendung von Gurgellösung-ratiopharm® mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Dequaliniumchlorid wird durch Eiweiß, Serum und Eiter in Gegenwart von üblichen Seifen sowie durch anionische, oberflächlich aktive Substanzen, Materialien wie poröse Stoffe (Gummi, Baumwolle, Kork) und Plastikmaterialien (Polyvinylchlorid, Polyethylen), Phospholipide und andere lipidhaltige Substanzen inaktiviert.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Schwangerschaft

Auch wenn Daten über eine begrenzte Anzahl von behandelten Schwangeren nicht auf schädliche Wirkungen von Gurgellösung-ratiopharm® auf die Schwangerschaft oder die Gesundheit des ungeborenen Kindes oder des Neugeborenen schließen lassen, sollten Sie Gurgellösung-ratiopharm® in der Schwangerschaft nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung durch Ihren behandelnden Arzt anwenden.

Stillzeit

Sie sollten Gurgellösung-ratiopharm® in der Stillzeit nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung durch Ihren behandelnden Arzt anwenden.