

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient!
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder Ihre Apotheke.



Acic[®] Creme bei Lippenherpes

Wirkstoff: Aciclovir

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil:
1 g Creme enthält 50 mg Aciclovir.

Sonstige Bestandteile:
Cetylalkohol, Dimeticon 350, Glycerolmonostearat, dickflüssiges Paraffin, Macrogolstearat 1500, Propylenglykol, weißes Vaseline, gereinigtes Wasser

Darreichungsform und Inhalt

Originalpackungen mit 2 g (N1) Creme

Acic[®] ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Virusinfektionen (Virostatikum).

HEXAL AG
Industriestraße 25
83607 Holzkirchen
Tel.: (08024) 908-0
Fax: (08024) 908-1290
e-mail: patientenservice@hexal.de

Hersteller
Salutas Pharma GmbH,
ein Unternehmen der HEXAL AG
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Balleben

Anwendungsgebiete

Zur lindernden Behandlung von Schmerzen und Juckreiz bei häufig wiederkehrenden Herpesinfektionen mit Bläschenbildung im Lippenbereich (rezidivierender Herpes labialis).

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Acic[®] nicht anwenden?

Sie dürfen Acic[®] nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen Aciclovir oder einen der sonstigen Bestandteile.

Wann dürfen Sie Acic[®] erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden?

Im Folgenden wird beschrieben, wann Sie Acic[®] nur unter bestimmten Bedingungen und nur mit besonderer Vorsicht anwenden dürfen. Befragen Sie hierzu bitte Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn diese Angaben bei Ihnen früher einmal zutraten.

Falls bei Ihnen eine schwere Störung der körpereigenen Immunabwehr vorliegt, sollten Sie Ihren Arzt vor Behandlungsbeginn darauf hinweisen.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Sie dürfen Acic[®] nicht auf Schleimhäute (z. B. in der Mundhöhle oder am Auge) auftragen, da sonst mit örtlichen Reizerscheinungen zu rechnen ist.

Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Acic[®] nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Acic[®] sonst nicht richtig wirken kann.

Wie viel Creme und wie oft sollten Sie Acic[®] anwenden?

Tragen Sie die Creme 5mal täglich alle 4 Stunden auf die infizierten Hautbereiche dünn auf.

Wie und wann sollten Sie Acic[®] anwenden?

Tragen Sie Acic[®] mit einem Wattestäbchen auf, das mit einer für die Größe der infizierten Hautbereiche notwendigen Menge bestrichen wird. Achten Sie beim Auftragen darauf, dass Sie nicht nur die bereits sichtbaren Anzeichen des Herpes (Bläschen, Schwellung, Rötung) mit der Creme bedecken, sondern dass Sie auch angrenzende Bereiche in die Behandlung mit einbeziehen. Falls Sie das Auftragen mit den Fingern vornehmen, sollten Sie diese vorher und nachher intensiv reinigen, um eine zusätzliche Infektion der geschädigten Hautpartie (z. B. durch Bakterien) bzw. eine Übertragung der Viren auf noch nicht infizierte Schleimhaut- und Hautbereiche zu verhindern.

Besonderer Hinweis

Um einen größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, sollten Sie Acic[®] bereits bei den ersten Anzeichen der Herpeserkrankung (Brennen, Jucken, Spannungsgefühl und Rötung) anwenden.

Wie lange sollten Sie Acic[®] anwenden?

Über die Dauer der Anwendung entscheidet der behandelnde Arzt.

Die Behandlungsdauer beträgt im Allgemeinen 5 Tage. Im Einzelfall führen Sie die Behandlung so lange durch, bis die Bläschen verkrustet oder abgeheilt sind. Sie sollten jedoch eine Behandlungsdauer von 10 Tagen nicht überschreiten.

Überdosierung und andere Anwendungsfehler

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig Acic[®] angewendet oder eine Anwendung vergessen haben?

Setzen Sie die Behandlung wie verordnet fort (fragen Sie die Creme z. B. nicht häufiger oder dicker auf).

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden wollen?

Für eine erfolgreiche Behandlung ist es wichtig, Acic[®] ausreichend lange anzuwenden (siehe auch "Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung").

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Acic[®] auftreten?

Nach dem Auftragen von Acic[®] kann vorübergehendes Brennen oder Stechen an den behandelten Hautabschnitten auftreten.

Rötung, Eintrocknung, Juckreiz und Abschupung der mit Acic® behandelten Haut wurden gelegentlich beobachtet.

Selten wurde nach Anwendung von Acic® vom Auftreten einer allergischen Hautreaktion (Kontaktdermatitis) berichtet. Wurden allergologische Untersuchungen durchgeführt, erwiesen sich in den meisten Fällen die Hilfsstoffe der Creme-Grundlage und nicht der Wirkstoff Aciclovir als Ursache der Hautreaktion.

Eine Kontaktdermatitis ist daran zu erkennen, dass die obengenannten Nebenwirkungen verstärkt auftreten und über die mit Creme behandelten Hautabschnitte hinausgehen. In diesem Fall sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Packung aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

Wie ist Acic® aufzubewahren?

Bewahren Sie Acic® nicht unter 8 °C auf.

Stand der Information

Juli 2005

Bitte bewahren Sie das Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf!

Ihre Ärztin/Ihr Arzt, Ihre Apotheke und HEXAL wünschen gute Besserung!

591453

PATIENTEN-INFORMATION

Acic® Creme bei Lippenherpes

Acic® ist eine wirksame Creme bei Herpes-Infektionen. Acic® befreit Sie von den lästigen und schmerzhaften Lippenbläschen – oder lässt diese erst gar nicht entstehen.

Vor der ersten Anwendung lesen Sie bitte die folgenden Informationen aufmerksam.

9 von 10 Menschen haben Herpes

Lippenbläschen werden durch Herpes-Viren verursacht, die sehr weit verbreitet sind. Die erste Infektion passiert oft schon im Säuglingsalter. Fast 90 % aller Erwachsenen haben Herpes-Viren im Körper. Viele merken nie etwas von ihrer Infektion, andere leiden immer wieder unter den Lippenbläschen.

Der Trick der Herpes-Viren

Um sich vermehren zu können, braucht das Herpes-Virus andere Zellen. In diese schleust es seine Erbsubstanz ein und zwingt sie, neue Viren herzustellen. Ist die befallene Zelle mit neuen Viren angefüllt, platzt sie auf und stirbt. Die freigesetzten Herpes-Viren schwärmen aus zum Angriff auf weitere Zellen.

Schnelligkeit ist Trumpf

Acic® stoppt die Vermehrung der Herpes-Viren. Je schneller Sie zu Acic® greifen, umso besser kann es wirken. Sobald sich also Lippenbläschen durch die typischen Vorboten wie Jucken, Kribbeln, Spannungsgefühl und Brennen ankündigen, ist es höchste Zeit für Acic®.

Sauber, sauber

Herpes-Viren sind extrem ansteckend. Tragen Sie deshalb Acic® nicht mit den Fingern, sondern mit einem Wattestäbchen auf die befallene Stelle auf.

Falls Sie die Creme mit den Fingern auftragen, sollten Sie die Hände vorher und nachher gründlich waschen. Sie vermeiden dadurch einerseits eine zusätzliche (z. B. bakterielle) Infektion der bereits betroffenen Lippenbereiche und andererseits eine Verbreitung der Herpes-Viren.

5mal täglich Acic® Creme bei Lippenherpes

Um auch das letzte Herpes-Virus zu erwischen, sollten Sie Acic® 5mal täglich auftragen, also ca. alle 4 Stunden.

Länger als 10 Tage sollte Acic® ohne ärztlichen Rat allerdings nicht angewendet werden.

Jedem seine Tube

Grundsätzlich gilt: Jedem Herpes sein Acic®! Das heißt, um eine gegenseitige Ansteckung auszuschließen, sollte jeder seine eigene Acic®-Tube benutzen.

Gehen Sie auf Abstand

Achten Sie darauf, dass Sie ihre Mitmenschen nicht anstecken. Gehen Sie sicherheitshalber auf Abstand und benutzen Sie z. B. Gläser, Bestecke oder Zahnbürsten nicht gemeinsam. Und den Gute-Nacht-Kuss verschieben Sie auch lieber, bis alles wieder gut ist. Denn besonders für kleine Kinder kann eine Herpes-Infektion gefährlich sein.

Acic® Creme bei Lippenherpes für alle Fälle

Auslöser für Herpes können Situationen sein, die die körpereigene Abwehr schwächen. Also z. B. Stress, zu starke Sonnenbestrahlung, Fieber, Verletzungen, Menstruation, Urlaubsreisen und Ernährungsumstellungen. Sie sollten also für alle Fälle Acic® im Haus haben, damit die Herpes-Viren bei Ihnen keine Chance haben.